

достигання плодів - середній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 145 ц/га, середній урожай з дерева - 51 кг, середня маса плоду - 8,8 г, максимальна - 9,5 г. Зимостійкість та посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою мухою - 2 бали. Вміст загального цукру - 11,4%, вітаміну С - 3,5 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 7 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

## ® 04085005 Ласуня

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, бруньки - злегка відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, середньої ширини, помірного зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного кольору. Квітка середнього розміру. Пелюстки - округлі, доторкуються одна до одної. Плід - великий, серцеподібний. Закінчення лійки загострене. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок - багато. Сік - пурпуровий, м'якоть - темно-червона, середньої пружності. Кислотність - помірна, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - ранній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 122,0 ц/га, середній урожай з дерева - 43,0 кг, середня маса плоду - 8,0 г, максимальна - 9,8 г.

Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 8,4%, вітаміну С - 6,6 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 7-8 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.

## ® 04085002 Любимиця Туровцева

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Листкова пластинка довга, середньо широка. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку сильна. Черешок середньої довжини, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка мала. Пелюстки віночка округлої форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескате. Шкірка темно-червоного забарвлення, сочевичок середня кількість. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - пізній.