

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 76,4 ц/га, Полісся - 86,8 ц/га, гарантований приріст відповідно 15,8; 20,3 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання 9; 8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 75 і 76 %. Вміст крохмалю 74 - 76%, білка - 8 %.

### 05004050 Пірс МВ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Волоть щільна. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 8,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 74,3ц/га, гарантований приріст - 13,7 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

### 05004101 ПР38Б12

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 72,9 ц/га, Лісостепу - 90,4 ц/га, гарантований приріст відповідно 21,0 і 23,6 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 74%, білка 10 - 9 %.

### 06004027 ПВ 75 - 01

Заявник: Кітчен Сід кампані Інк.