

* Дані заявника.

*За даними заявника: Середня врожайність - 138,0 ц/га, середній урожай з дерева - 43,0 кг, середня маса плоду - 12,1 г, максимальна - 14,6 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 7,5%, вітаміну С - 6,7 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів. Строк досягання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

02085006 Простір

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок. Вегетативні бруньки - виразно відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкоав пластинка середньої довжини та ширини, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного кольору. Квітка велика. Пелюстки віночка широко-еліптичні, доторкуються одна до одної. Плід дуже великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду - плескате. Шкірка - темно-червона, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона. Пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній. Соковитість плоду середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини. Наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - середньопізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 105,4 ц/га, середній урожай з дерева - 47,8 кг, середня маса плоду - 10,0 г, максимальна - 12,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 3 бали, моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 8,7%, вітаміну С - 5,9 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів. Строк досягання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ. Лісостеп.

* Дані заявника.

02085003 Суперниця

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабе. Листкова пластинка темно-зелена, довга, вузька. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки світло-червоного забарвлення. Квітка - велика. Пелюстки віночка широко-еліптичної форми, розміщені вільно. Плід дуже великий, серцеподібної форми. Закінчення лійки плоду - плескате. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок - мало. Сік - червоний, м'якоть - червона. Плід - пружний, середньо соковитий, кислотність - низька, вміст цукрів - середній. Плодоніжка середньої довжини, тонка, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 136,5 ц/га, середній урожай з дерева - 62,0 кг, середня маса плоду - 9,0 г, максимальна - 14,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 10,3%, вітаміну С - 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середньопізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

89085001 Темпоріон

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньорозгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, середньої ширини, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного кольору. Квітка велика. Пелюстки еліптичної форми, доторкуються одна до одної. Плід дуже великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду плескате. Шкірка - темно-червоного забарвлення, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - помірна, вміст цукрів - середній. Соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 153,0 ц/га, середній урожай з дерева - 75,3 кг, середня маса плоду - 10,5 г, максимальна - 14,0 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 12,2%, вітаміну С - 6,7 мг%. Дегустаційна оцінка - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

® 04085004 Шанс

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - злегка відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, помірного зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок середньої довжини, залозки - відсутні. Квітка середнього розміру. Пелюстки - округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескате. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок - багато. Сік - пурпуровий м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - помірна, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка - середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - середній.

* Дані заявника.