

\*За даними заявника: середня врожайність - 136,5 ц/га, середній урожай з дерева - 62,0 кг, середня маса плоду - 9,0 г, максимальна - 14,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 10,3%, вітаміну С - 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середньопізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

\* Дані заявника.

### **89085001 Темпоріон**

**Заявник:** Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньорозгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, середньої ширини, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного кольору. Квітка велика. Пелюстки еліптичної форми, доторкуються одна до одної. Плід дуже великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду плескате. Шкірка - темно-червоного забарвлення, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - помірна, вміст цукрів - середній. Соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - пізній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 153,0 ц/га, середній урожай з дерева - 75,3 кг, середня маса плоду - 10,5 г, максимальна - 14,0 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 12,2%, вітаміну С - 6,7 мг%. Дегустаційна оцінка - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

\* Дані заявника.

### **® 04085004 Шанс**

**Заявник:** Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

**Підтримувач(і):**

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

\*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - злегка відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, помірного зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок середньої довжини, залозки - відсутні. Квітка середнього розміру. Пелюстки - округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескате. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок - багато. Сік - пурпуровий м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - помірна, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка - середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - середній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 137,1 ц/га, середній урожай з дерева - 46,0 кг, середня маса плоду - 9,8 г, максимальна - 11,8 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 10,8%, вітаміну С - 6,8 мг%. Дегустаційна оцінка й транспортабельність - 9 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.

## Слива

### ® 06080001 Ненька

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.

\*Дерево слаборосле. Крона - помірно щільна. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Плодушка середньої довжини. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена від пагона. Листок розташований горизонтально стосовно пагона. Листкова пластинка широкоовальна, з прямим або майже прямим кінчиком, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Глянцуватість верхнього боку слабка, опушення нижнього боку - слабке. Край листової пластинки пилчастий. Черешок середньої довжини, слабко опушений з верхнього боку. Боріздка - мілка. Залозки розташовані на основі листка й на черешку. Квітки на однорічних гілочках відсутні. Квітка середнього розміру, пелюстки віночка доторкуються. Чашолисток - вузькоеліптичний. Пелюстка обернено-яйцевидної форми, слабко хвиляста по краю. Приймочка маточки розташована на рівні пиляків. Плід великий, продовгуватий, рівнобокий. Верхівка - плеската. Лійка - мілка. Основне покривне забарвлення плоду - фіолетово-синє. М'якоть жовта, щільна, соковита. Кісточка добре відділяється від м'якоті. Середнього розміру, округло-еліптична - у профіль. Зі шва кісточка майже кулеподібна, з основи - округло-еліптична. Симетрична - зі шва та у профіль. Бокова поверхня кісточки - зерниста. Край спинних швів суцільний. Черевний шов - середньої ширини. Кісточка середньої ширини, з прямою або майже прямою основою та гострою верхівкою. Час цвітіння - середній. Строк достигання - ранній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність 154,3 ц/га, середній урожай з дерева - 37,0 кг, середня маса плоду - 42,1 г, максимальна - 58,7 г. Зимостійкість - 8 балів, посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: моніліальним опіком - 5%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1-2 бали, кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 9,4%, вітаміну С - 5,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт раннього строку достигання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.