

Агрус

® 06071001 Легінь

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.

*Рослина слабкоросла, нещільна, яйцеподібної форми. Однорічний пагін прямий, дуже слабо вигнутий. Базальних пагонів кілька. Колючки - відсутні. У верхній третині пагона щетинки відсутні або їх дуже мало. Антоціанове забарвлення молодого пагона слабе. Молодий листок помірного зеленого забарвлення. Антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабе. Повністю розвинутий листок середнього розміру, помірно глянцеуватий з верхнього боку. Кут основи відносно черешка - гострий. Переважна кількість квіток у суцвітті - дві. Антоціанове забарвлення зав'язі слабе, опушення - відсутнє або дуже слабе. Ягода - велика, еліпсоподібна, червоного кольору. Восковий наліт - слабкий. Волохатість - відсутня або дуже слабка. Жилкування - помірне. Шкірка - середньої товщини. Подовження основи ягоди середнє. Плодоніжка середньої довжини. Час розпускання бруньок - пізній. Час цвітіння - пізній. Час досягання ягід - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 184,0 ц/га, середній урожай з куща - 2,3 кг, середня маса ягоди - 4,7 г, максимальна - 8,9 г. Зимо- та посухостійкість - 7-8 балів. Стійкість проти хвороб: антракнозу та борошнистої роси - 7-8 балів. Вміст загального цукру - 6,76%, вітаміну С - 35,3 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7 балів. Транспортабельність - 7-8 балів. Строк досягання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

Малина

® 05077002 Космічна

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Національний аграрний університет.

*Рослина утворює середню кількість молодих пагонів без шипів. Восковий наліт на повністю розвинутих пагонах сильний. Пагони поточного року середньої довжини. Рельєфність між жилками листка сильна. Листочків - іноді три, іноді п'ять. Вони доторкуються один до одного. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку листка помірна. Черешок нижньої пари бічних листочків дуже короткий. Квітка середнього розміру. Антоціанове забарвлення квітконіжки відсутнє. Плодоносні пагони середньої довжини. Плід помірно-червоний, великий, довший, ніж ширший, твердий, помірно глянцеуватий. Схильність до утворення квітколожа помірна. Період основного плодоношення - на пагонах поточного року, восени. Час появи пагонів - ранній. Час досягання - ранній. Тривалість урожайного сезону - довга.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 82,0 ц/га (осінній збір), середня маса ягоди - 3,4 г, максимальна - 8,3 г. Ступінь підмерзання бруньок - 2 бали. Посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю й антракнозом - 1 бал. Шкідниками не пошкоджується. Вміст загального цукру - 6,4%, вітаміну С - 55,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів. Сорт ремонтантний.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.