

® **05077003 Сяйво**

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Національний аграрний університет.

*Рослина утворює середню кількість молодих пагонів без шипів. На повністю розвинутих пагонах сильний восковий наліт. Пагони поточного року короткі. Рельєфність між жилками листка помірна. Кількість листочків - звичайно три. Вони доторкуються один до одного. Верхній бік листка темно-зеленого забарвлення. Черешок нижньої пари бічних листочків дуже короткий. Квітка середнього розміру. Антоціанове забарвлення квітконіжки відсутнє. Плодоносні пагони короткі. Плід темно-червоний, середнього розміру, однакової довжини й ширини, помірно твердий, помірно глясுவатий. Схильність до утворення квітколожа - помірна. Період основного плодоношення - на пагонах поточного року, восени. Час появи пагонів - дуже ранній. Час достигання - дуже ранній. Тривалість урожайного сезону - довга.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 78,0 ц/га (осінній збір), середня маса ягоди - 2,7 г, максимальна - 6,1 г. Ступінь підмерзання бруньок - 1,8 балів. Посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю - 1,5 балів, антракнозом - 1 бал. Шкідниками не пошкоджується. Вміст загального цукру - 7,0%, вітаміну С - 60,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортальність - 7 балів. Сорт - ремонтантний. Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® **99077002 Феномен**

Заявник: Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Краснокутський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.

*Рослина утворює малу кількість молодих пагонів. Дуже молоді пагони з помірним антоціановим забарвленням. Молоді пагони вкриті пурпуровими шипами, розташованими нещільно у центральній третині пагона. Восковий наліт повністю розвинутих пагонів - слабкий. Пагони у стані спокою середньої довжини, сіро-коричневого кольору. Рельєфність між жилками листка - помірна. Кількість листочків - звичайно п'ять. Вони доторкуються один до одного. Верхній бік листка - помірного зеленого забарвлення. Черешок нижньої пари бічних листочків середньої довжини. Квітка - велика. Антоціанове забарвлення квітконіжки - відсутнє. Плодоносні пагони - довгі. Плід - пурпуровий, великий, довший, ніж ширший, твердий, помірно глясுவатий. Період основного плодоношення - на пагонах минулого року, влітку. Час розкриття бруньок - середній. Час цвітіння - середній. Тривалість урожайного сезону - довга.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 146,0 ц/га, середня маса ягоди - 7,1 г, максимальна - 10,2 г. Ступінь підмерзання бруньок - 0,5 балів. Посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю - 1,5 балів, антракнозом - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: малиновим довгонощиком - 1 бал, попелицею - 1,5 балів. Вміст загального цукру - 7,6%, вітаміну С - 44,7 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортальність - 7-8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.