

Порічки (червоні і білі)**® 06082001 Ласуня**

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

\*Рослина середньоросла, середньощільна, кущиста. Головних пагонів - середня кількість. Час розпускання бруньок - середній. Цвітіння - середнє. У суцвітті багато квіток. Вісь суцвіття зі слабким антоціановим забарвленням. Квітка середнього розміру. Чашечка - блюдцеподібна, з помірним антоціановим забарвленням. Час початку цвітіння - середній. Молодий листок темно-зеленого забарвлення. Антоціанове забарвлення молодого пагона - помірне, опушення - помірне. Повністю розвинутий листок середнього розміру, темно-зелений - з верхнього боку. Черешок листка середньої товщини. Час досягання ягід - ранній. Загальна довжина грона - середня, довжина стрижня - середня. Ягода середнього розміру, округла, червона, тверда.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 120,0 ц/га, середня маса ягоди - 0,9 г, максимальна - 1,1 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: борошнистою россою - не уражується, антракнозом - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - не пошкоджується, попелицею - 0,5 балів. Вміст загального цукру - 9,1%, вітаміну С - 57,8 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 7 балів.

Напряв використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

\* Дані заявника.

Смородина чорна**® 06083001 Консул**

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка.

\*Кущ середньої висоти, із середньою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки слабе, восковий наліт - слабкий. Молодий пагін із слабким антоціановим забарвленням. Листок з верхнього боку темно-зеленого забарвлення, помірно блискучий. Форма язичка листкової пластинки - відкрита. Черешок листка зі слабким антоціановим забарвленням, що розташоване рівномірно по черешку. З однієї бруньки утворюється одне або два квіткових грона. Антоціанове забарвлення часток оцвітини - помірне, зав'язі - слабе. Ягода дуже велика, округла, помірно тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід - велика. Час розвитку бруньок - ранній. Час початку цвітіння - ранній. Час досягання ягід - ранній.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 155,0 ц/га, середня маса ягоди - 2,5 г, максимальна - 4,1 г. Зимо- та посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: борошнистою россою й антракнозом - 1-2 бали. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем і попелицею - 1 бал. Вміст загального цукру - 6,4%, вітаміну С - 224,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 9 балів. Транспортабельність - 7 балів.

Напряв використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.