

**® 05084010 Корона**

Заявник: Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

Власник(и): Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

Підтримувач(і):

Заявник - Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

\*Рослина куляста, середньощільна, помірної сили росту. Листок - темно-зелений з верхнього боку, помірно блискучий. Пухирчастість - помірна. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з тупою основою та пилчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку сильно відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка відсутнє або дуже слабке. Рослина утворює середню кількість помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розміщене під листками. Квітка середнього розміру. Чашечка однакового розміру з віночком. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Плід великий, дещо довший, ніж ширший, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Нерівності на поверхні - відсутні або дуже слабкі. Плід рівномірного червоного забарвлення, помірно блискучий. Зернятка та чашечка - заглиблені. Частки чашечки - відлеглі. М'якоть червона, помірно тверда. Повітряна комірка середнього розміру. Червоне забарвлення м'якоті розташоване тільки на периферії плоду. Час цвітіння - ранній. Час досягання - ранній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 160,0 ц/га, середня маса ягоди - 12,5 г, максимальна - 33,1 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси й сірої гнилі - 7 балів. Стійкість проти шкідників: сунічного кліща та нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 7,93%, вітаміну С - 62,23 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8 балів. Транспортабельність - 7-8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

\* Дані заявника.

**® 05084003 Полка**

Заявник: Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

Власник(и): Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

Підтримувач(і):

Заявник - Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

\*Рослина куляста, середньощільна, сильноросла. Листок помірно блискучий, зелений, сильно пухирчастий. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з гострою основою, із зубчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку злегка відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка слабке. Рослина утворює багато помірно опушених вусів із слабким антоціановим забарвленням. Суцвіття розміщене на рівні листків. Квітка середнього розміру. Чашечка однакового розміру з віночком. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Плід середнього розміру, дещо ширший, ніж довший, переважно округлої форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду, вільна від зерняток, мала. Нерівності на поверхні - відсутні або дуже малі. Плід дуже блискучий, злегка нерівномірного червоного кольору. Зернятка розміщені врівень з поверхнею. Чашечка - виступаюча. Частки - відлеглі. М'якоть - ясно-червона, помірно тверда. Повітряна комірка середнього розміру. Червоне забарвлення розташоване лише на периферії плоду. Час цвітіння - ранній. Час досягання - середньопізній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 180,0 ц/га, середня маса ягоди - 10,2 г, максимальна - 27,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси та сірої гнилі - 9 балів. Стійкість проти шкідників: сунічного кліща - 7 балів, нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 6,8%, вітаміну С - 62,11 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 7-8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.