

## Горіх грецький

® 97075002 Рудківський

Заявник: Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Придністровська дослідна станція Інституту садівництва УААН.

\*Дерево сильноросле, розлоге, середньощільне. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів, на гілках, вік яких від 2 років. Річний пагін світло-коричневого кольору. Бічні листочки листка еліптичної форми. Чоловічих суцвіть - багато. Горіх великий, широко-трапецієвидний - у поздовжньому розрізі через шов і перпендикулярно до нього, округлий - у поперечному розрізі. Коефіцієнт округлості горіха - низький. Форма основи- зрізана, верхівка - округла. Помітність апікального кінчика - помірна. "Сідельце" розташоване у верхній третині шва, помітність - помірна, ширина - помірна. Боріздка вздовж "сідельця" неглибока. Шкаралупа горіха слабо боріздчаста, тонка. Половинки з'єднані слабо, роз'єднуючі перетинки тонкі. Ядро легко видаляється зі шкаралупи, велике. Час достигання - ранній. Час листопаду - середній. Листок обпадає, оплодень - обпадає повністю. Час розпускання вегетативних бруньок - ранній. Час цвітіння чоловічих квіток - між дуже раннім і раннім. Час цвітіння жіночих квіток - між пізнім і дуже пізнім.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 6,9 ц/га, середній урожай з дерева - 5,5 кг, середня маса плоду - 13,6 г. Зимостійкість - 7 балів. Стійкість проти хвороб: марсоніозу - 7 балів. Дегустаційна оцінка ядра - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.