

Виноград Виноград

® 97073003 Альмінський

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт технічного напрямку використання пізньостиглий, у середньому 148 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівка молодого пагона відкрита повністю. Колір верхнього боку листової пластинки молодого листка жовто-зелений. Пагін напівпрямий, колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) сторони зелений. Послідовних вусиків менше трьох, вони дуже довгі. Квітка має добре розвинуті тичинки і маточку. Розвинутий листок великого розміру п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Зубці довгі, обидва боки випуклі. Черешок однаковий за довжиною з головною жилкою. Гроно середнього розміру, середньощільне. Ягода за розміром середня кругла, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синя середньої товщини. М'якоть соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий, борознистий.

* Дані заявника.

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 148 днів від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 132 ц/га, середня маса грона – 206 г, середня маса 100 ягід – 238г. Цукристість –26,8 %, кислотність – 8,0 г/л. Вихід соку (сусла) 66 %. Зимостійкість середня. Має мускатний аромат. Рекомендовано використовувати для виготовлення сухих та міцних (десертних) вин, диетичних соків у 2-ій виноградарській зоні України.

* Дані заявника.

® 00073006 Анателікон

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт дуже пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 174 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розпускаються пізно. Верхівка молодого пагона повністю відкрита. Верхній бік листової пластинки жовто-зелений. Положення пагона у просторі напівпряме, колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листових вирізів глибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки випуклі. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Гроно середньовелике щільне, ніжка - середньої довжини. Ягода дрібна еліптична, важко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору товста. М'якоть малосоковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий, ребристий.

* Дані заявника.

* Сорт дуже пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 174 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 142 ц/га, середня маса грона – 220 г, середня маса 100 ягід – 300 г. Цукристість –30,6 %, кислотність – 9,5 г/л. Вихід соку (сусла) 65 %. Зимостійкість середня. Десертне вино з ароматом вершків та шоколаду. Рекомендовано використовувати у 2-ій виноградарській зоні України.