

* Дані заявника.

94073015 Біанка

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт середньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 136 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, технічна стиглість настає, в середньому, 10 вересня. Бруньки розпускаються в середні строки. Верхівка молодого пагона напіввідкрита, прилеглі волоски мають слабе антоціанове забарвлення. Верхній бік листової пластинки жовто-зелений. Положення пагона у просторі напівпряме, колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів та вентральної (без прямого попадання денного світла) – зелений із червоними смугами. Послідовних вусиків три і більше, вони довгі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром, пластинка округла з трьома лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - слабо відкриті. Верхні листові вирізи неглибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки увігнуті. Черешок листка значно довший головної жилки. Гроно середнє за розміром і щільністю, ніжка – середньої довжини. Ягода середня за розміром, овальна, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка жовто-зеленого кольору тонка. М'якоть дуже соковита, м'яка. Особливий запах відсутній. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий ребристий.

* Дані заявника.

* Середньостійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 130 ц/га, з куща – 5,9 кг, середня маса грона – 108 г, середня маса 100 ягід – 180 г. Цукристість –22,6 %, кислотність – 9,1 г/л. Вихід соку (сусла) 85,2 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано використовувати для виготовлення портвейну та мадери.

* Дані заявника.

® 97073001 Геркулес

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

* Сорт столового напрямку використання дуже пізньостиглий, 172 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів пагона - зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Листок середній 7- лопатевий, пластинка п'ятикутна. Верхні листові вирізи (між лопатями листка) - дуже глибокі. Верхні лопаті листових вирізів злегка перекривають одна одну, біля черешка - широко відкриті. Гроно велике середньої щільності. Ягода велика еліптична, колір шкірки рожевий. М'якоть тверда, соковита. Насіння повноцінне.

* Дані заявника.

*Сорт столового напрямку використання. Сійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 118 ц/га, середня маса грона – 254 г, середня маса 100 ягід – 571 г. Цукристість –19,1 %, кислотність – 7,7 г/л. Вихід товарних грон 95 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано використовувати у 6-ій виноградарській зоні України.

* Дані заявника.

® 05073004 Добриня

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):