

\* Дані заявника.

### **94073015 Біанка**

**Заявник:** Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

\*Сорт середньостиглий технічного напряму використання, у середньому 136 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti, технічна стиглість настає, в середньому, 10 вересня. Бруньки розпускаються в середні строки. Верхівка молодого пагона напіввідкрита, прилеглі волоски мають слабке антоціанове забарвлення. Верхній бік листкової пластинки жовто-зелений. Положення пагона у просторі напівпрямe, колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів та вентральної (без прямого попадання денного світла) – зелений із червоними смугами. Послідовних вусиків три і більше, вони довгі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром, пластинка округла з трьома лопатями. Лопаті верхніх листкових вирізів відкриті, біля черешка - слабко відкриті. Верхні листкові вирізи неглибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки увігнуті. Черешок листка значно довший головної жилки. Гроно середнє за розміром і щільністю, ніжка – середньої довжини. Ягода середня за розміром, овальна, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка жовто-зеленого кольору тонка. М'якоть дуже соковита, м'яка. Особливий запах відсутній. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий ребристий.

\* Дані заявника.

\* Середньостійкий до філоксери, міldью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 130 ц/га, з куща – 5,9 кг, середня маса грана – 108 г, середня маса 100 ягід – 180 г. Цукристість – 22,6 %, кислотність – 9,1 г/л. Вихід соку (сусла) 85,2 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано використовувати для виготовлення портвейну та мадери.

\* Дані заявника.

### **® 97073001 Геркулес**

**Заявник:** Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

\* Сорт столового напряму використання дуже пізньостиглий, 172 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів пагона - зелений із червоними штрихами (смугами), вертимальної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Листок середній 7- лопатевий, пластинка п'ятикутна. Верхні листкові вирізи (між лопатями листка) - дуже глибокі. Верхні лопаті листкових вирізів злегка перекривають одна одну, біля черешка - широко відкриті. Гроно велике середньої щільності. Ягода велика еліптична, колір шкірки рожевий. М'якоть тверда, соковита. Насіння повноцінне.

\* Дані заявника.

\*Сорт столового напряму використання. Стійкий до філоксери, міldью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 118 ц/га, середня маса грана – 254 г, середня маса 100 ягід – 571 г. Цукристість – 19,1 %, кислотність – 7,7 г/л. Вихід товарних грон 95 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано використовувати у 6-ї виноградарській зоні України.

\* Дані заявника.

### **® 05073004 Добриня**

**Заявник:** Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

\*Час розгортання бруньок середній. Форма верхівки молодого пагона закрита. Прилеглі волоски на верхівці відсутні або дуже рідкі. Антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці відсутнє або дуже слабке. Колір верхнього боку пластинки жовто-зелений. Відхилені та прилеглі волоски між жилками із нижнього боку пластинки молодого листка відсутні або дуже рідкі. Положення пагонів у просторі, ще не підв'язаних, пряме. Колір дорсального (добре освітленої) боку міжвузлів - червоний, центрального (без прямого попадання денного світла) - зелений. Кількість послідовних вусиків пагону менше трьох. У квітки відхилені тичинки і добре розвинута маточка. Розмір пластинки розвиненого листка великий. Форма пластинки розвиненого листка округла. Розвинutий листок у поперечному перерізі згорнутий всередину. Пухирчастість верхнього боку пластинки відсутня або дуже слабка. Розвинений листок п'ятилопатевий. Верхні листкові вирізи середні, відкриті, лопаті біля черешка широко відкриті. Листкові зубці середні, за формою обидва боки випуклі. Антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки відсутнє або дуже слабке. Черешок розвиненого листка за довжиною трохи коротший головної жилки. Основне забарвлення здерев'янілого пагона жовтувато-коричневе. Поверхня здерев'янілого пагона боріздаста.

\*Дані заявника.

\*Слабко утворює пасинки, утворює гроно. Сила росту однорічних пагонів середня. Сорт зимостійкий, посухостійкий. Стійкий до філоксери, міldью, оїдіуму. Ступінь досягнення однорічних пагонів становить 96 %. Вихід стандартних чубуків з куща - 25 шт., 55,5 т. шт/га. Вихід кореневласників саджанців першого ґатунку - 70 %.

\* Дані заявника.

## ® 05073002 Етюд

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

\*\*Сорт столового напряму використання, середньостиглий – 144 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Верхівка молодого пагона повністю відкрита. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Листок середній 3 - лопатевий, пластинка округла. Лопаті біля черешка - дуже широко відкриті. Гроно від великого до дуже великого за розміром, щільне. Ягода за розміром від середньої до великої, кругла, колір шкірки жовто-зелений, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. М'якоть м'яка, соковита. Насіння повноцінне. Здерев'янілій пагін жовтувато-коричневий.

\* Дані заявника.

\*Стійкий до філоксери, міldью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 124,5 ц/га, середня маса грана – 576,5 г, середня маса 100 ягід – 525 г. Цукристість – 16,4 %, кислотність – 8,5 г/л. Вихід товарних грон 89 %. Зимостійкість середня.

\* Дані заявника.

## ® 05073007 Кишмиш таїровський

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

\*Сорт столового напряму використання, пізньостиглий – 147 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Верхівка молодого пагона закрита. Колір верхнього боку пластинки молодого листка жовто-зелений. Колір дорсальної (добре освітленої) частини міжвузлів пагона - зелений із червоними смугами, центральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, вони довгі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середнього розміру серцевидний, з п'ятьма лопатями. Верхні листкові вирізи глибокі, верхні лопаті злегка перекривають одну одну, біля черешка - широко відкриті. Зубці довгі, обидва боки прямолінійні. Гроно нещільне. Ягода яйцеподібна рожева, соковита, м'яка, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Насіння відсутнє. Основне забарвлення здерев'янілого