

*Час розгортання бруньок середній. Форма верхівки молодого пагона закрыта. Прилеглі волоски на верхівці відсутні або дуже рідкі. Антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці відсутнє або дуже слабке. Колір верхнього боку пластинки жовто-зелений. Відхилені та прилеглі волоски між жилками із нижнього боку пластинки молодого листка відсутні або дуже рідкі. Положення пагонів у просторі, ще не підв'язаних, пряме. Колір дорсального (добре освітленої) боку міжвузлів - червоний, вентрального (без прямого попадання денного світла) - зелений. Кількість послідовних вусиків пагону менше трьох. У квітки відхилені тичинки і добре розвинута маточка. Розмір пластинки розвиненого листка великий. Форма пластинки розвиненого листка округла. Розвинутий листок у поперечному перерізі згорнутий всередину. Пухирчастість верхнього боку пластинки відсутня або дуже слабка. Розвинений листок п'ятилопатевий. Верхні листові вирізи середні, відкриті, лопаті біля черешка широко відкриті. Листкові зубці середні, за формою обидва боки випуклі. Антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки відсутнє або дуже слабке. Черешок розвиненого листка за довжиною трохи коротший головної жилки. Основне забарвлення здерев'янілого пагона жовтувато-коричневе. Поверхня здерев'янілого пагона борізчаста.

*Дані заявника.

*Слабко утворює пасинки, утворює гроно. Сила росту однорічних пагонів середня. Сорт зимостійкий, посухостійкий. Стійкий до філоксери, мілдью, оїдіуму. Ступінь досягання однорічних пагонів становить 96 %. Вихід стандартних чубуків з куща - 25 шт., 55,5 т. шт/га. Вихід кореневласних саджанців першого ґатунку - 70 %.

* Дані заявника.

® 05073002 Етюд

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

**Сорт столового напряму використання, середньостиглий – 144 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Верхівка молодого пагона повністю відкрита. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Листок середній 3 - лопатевий, пластинка округла. Лопаті біля черешка - дуже широко відкриті. Гроно від великого до дуже великого за розміром, щільне. Ягода за розміром від середньої до великої, кругла, колір шкірки жовто-зелений, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. М'якоть м'яка, соковита. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий.

* Дані заявника.

*Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 124,5 ц/га, середня маса грона – 576,5 г, середня маса 100 ягід – 525 г. Цукристість – 16,4 %, кислотність – 8,5 г/л. Вихід товарних грон 89 %. Зимостійкість середня.

* Дані заявника.

® 05073007 Кишмиш таїровський

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт столового напряму використання, пізньостиглий – 147 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Верхівка молодого пагона закрыта. Колір верхнього боку пластинки молодого листка жовто-зелений. Колір дорсальної (добре освітленої) частини міжвузлів пагона - зелений із червоними смугами, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, вони довгі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середнього розміру серцевидний, з п'ятьма лопатями. Верхні листові вирізи глибокі, верхні лопаті злегка перекривають одна одну, біля черешка - широко відкриті. Зубці довгі, обидва боки прямолінійні. Гроно нещільне. Ягода яйцеподібна рожева, соковита, м'яка, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Насіння відсутнє. Основне забарвлення здерев'янілого

пагона жовтувато-коричневе, поверхня гладенька.

*Дані заявника.

*Стійкий до сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 58 ц/га, з куща - 2,6 кг, середня маса грона - 253 г, середня маса 100 ягід – 165 г. Цукристість - 19,3 %, кислотність – 7,0 г/дм³. Вихід товарних грон 91 %. Транспортабельний.

* Дані заявника.

® 90073015 Огоньок таїровський

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт столового напрямку використання, дуже ранньостиглий – 125 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Час розгортання бруньок ранній. Антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці молодого пагону відсутнє або дуже слабке. Колір дорсального (добре освітленої) боку міжвузлів пагону та колір вентрального (без прямого попадання денного світла) міжвузлів пагону зелений. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Листок округлий, середній за розміром, верхні листкові вирізи мілкі, лопаті біля черешка широко відкриті. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Лопаті листка не виділяються. Зубці наявні, середні, обидва боки зубців прямолінійні. Гроно середнє за розміром, середньої щільності. Ягода велика, овальна, рожева, соковита. М'якоть ягоди тверда, аромат - відсутній. Ягода відокремлюється від плодоніжки порівняно легко. Насіння повноцінне. Основне забарвлення здерев'янілого пагону фіолетове.

* Дані заявника.

*Стійкий до мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 88 - 125 ц/га, з куща - 3,96 -5,65 кг, середня маса грона - 485 г, середня маса 100 ягід – 520 г. Цукристість - 16,8 %, кислотність – 6,9 г/дм³. Вихід товарних грон 78 %. Транспортабельний.

*Дані заявника.

® 83073001 Рислінг Магарача

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 155 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівка молодого пагона відкрита повністю. Колір верхнього боку листової пластинки молодого листка зелений із антоціановими плямами. Положення у просторі пагону пряме, колір дорсальної (добре освітленої) і вентральної (без прямого попадання денного світла) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, вони короткі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинутий листок середнього розміру округлий з трьома лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті мілкі, біля черешка - широко відкриті. Зубці середні, один бік випуклий, другий - увігнутий. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно середнього розміру, середньощільне, ніжка - коротка. Ягода середня за розміром, широко-еліптична, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка жовто-зелена середньої товщини. М'якоть дуже соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий, борознистий.

* Дані заявника.

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 155 днів від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 149 ц/га, середня маса грона – 172 г, середня маса 100 ягід – 276 г. Цукристість –21,2 %, кислотність – 8,6 г/л. Вихід соку (сусла) 70 %. Зимостійкість середня. Пропонується для виготовлення ігристих (шампанських), сухих та міцних вин, диетичних соків. Має рислінговий аромат.

* Дані заявника.