

пагона жовтувато-коричневе, поверхня гладенька.

*Дані заявника.

*Стійкий до сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 58 ц/га, з куща - 2,6 кг, середня маса грона - 253 г, середня маса 100 ягід – 165 г. Цукристість - 19,3 %, кислотність – 7,0 г/дм³. Вихід товарних грон 91 %. Транспортабельний.

* Дані заявника.

® 90073015 Огоньок таїровський

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт столового напрямку використання, дуже ранньостиглий – 125 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Час розгортання бруньок ранній. Антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці молодого пагону відсутнє або дуже слабке. Колір дорсального (добре освітленої) боку міжвузлів пагону та колір вентрального (без прямого попадання денного світла) міжвузлів пагону зелений. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Листок округлий, середній за розміром, верхні листкові вирізи мілкі, лопаті біля черешка широко відкриті. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Лопаті листка не виділяються. Зубці наявні, середні, обидва боки зубців прямолінійні. Гроно середнє за розміром, середньої щільності. Ягода велика, овальна, рожева, соковита. М'якоть ягоди тверда, аромат - відсутній. Ягода відокремлюється від плодоніжки порівняно легко. Насіння повноцінне. Основне забарвлення здерев'янілого пагону фіолетове.

* Дані заявника.

*Стійкий до мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 88 - 125 ц/га, з куща - 3,96 -5,65 кг, середня маса грона - 485 г, середня маса 100 ягід – 520 г. Цукристість - 16,8 %, кислотність – 6,9 г/дм³. Вихід товарних грон 78 %. Транспортабельний.

*Дані заявника.

® 83073001 Рислінг Магарача

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 155 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівка молодого пагона відкрита повністю. Колір верхнього боку листової пластинки молодого листка зелений із антоціановими плямами. Положення у просторі пагону пряме, колір дорсальної (добре освітленої) і вентральної (без прямого попадання денного світла) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, вони короткі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинутий листок середнього розміру округлий з трьома лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті мілкі, біля черешка - широко відкриті. Зубці середні, один бік випуклий, другий - увігнутий. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно середнього розміру, середньощільне, ніжка - коротка. Ягода середня за розміром, широко-еліптична, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка жовто-зелена середньої товщини. М'якоть дуже соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий, борознистий.

* Дані заявника.

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 155 днів від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 149 ц/га, середня маса грона – 172 г, середня маса 100 ягід – 276 г. Цукристість –21,2 %, кислотність – 8,6 г/л. Вихід соку (сусла) 70 %. Зимостійкість середня. Пропонується для виготовлення ігристих (шампанських), сухих та міцних вин, диєтичних соків. Має рислінговий аромат.

* Дані заявника.