

® 82073001 Спартанець Магарача

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

*Сорт технічного напряму використання, пізньостиглий, у середньому 142 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівка молодого пагона напівлідкрита. Колір верхнього боку листкової пластинки молодого листка світлий мідно-червоний. Пагін напівпрямий, колір дорсальної (добре освітленої) вентральної (без прямого попадання денного світла) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, вони дуже короткі. Квітка має добре розвинуті тичинки і маточку. Розвинений листок середнього розміру округлий, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листкових вирізів закриті, біля черешка - широко відкриті. Зубці довгі, один бік випуклий, другий - увігнутий. Черешок трохи довший за головну жилку. Гроно середнього розміру, середньо щільне, ніжка - коротка. Ягода середня за розміром, широко-еліптична, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка жовто-зелена середньої товщини. М'якоть соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий борознистий.

* Дані заявитника

*Сорт технічного напряму використання, пізньостиглий, у середньому 142 дні від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Стійкий до філоксери, міldью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 126 ц/га, середня маса грона – 172 г, середня маса 100 ягід – 223 г. Цукристість – 24,9 %, кислотність – 8,6 г/л. Вихід соку (сусла) 65 %. Зимостійкість середня. Має мускатний аромат. Рекомендовано використовувати для виготовлення ігристих (шампанських), сухих та міцних вин, дієтичних соків у 2-ї виноградарській зоні України.

* Дані заявитника.

® 84073003 Таїр

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

* Сорт столового напряму використання, ранньостиглий, 133 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Верхівка молодого пагона напівлідкрита. Колір верхнього боку пластинки молодого листка жовто-зелений. Колір дорсальної (добре освітленої) частини міжвузлів пагона - зелений із червоними смугами, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше 3. Листок великий трилопатевий, слабкорозсічений згорнутий всередину. Гроно дуже велике нещільне. Ягода дуже велика яйцеподібна чорно-синя, соковита, тверда. Насіння повноцінне. Основне забарвлення здерев'янілого пагона темно-коричневе, поверхня боріздчаста.

* Дані заявитника.

*Стійкий до міldью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 99,3 ц/га, з куща - 3,4 кг, середня маса грона - 316 г, середня маса 100 ягід – 443 г. Цукристість - 16,3 %, кислотність – 8,2 г/л. Транспорtabельний.

Рекомендовано використовувати у 2,6,8,9,11,13,14-ї виноградарських зонах України.

* Дані заявитника.

® 00073005 Чорна опіана

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):