

## ® 82073001 Спартанець Магарача

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

\*Сорт технічного напряму використання, пізньостиглий, у середньому 142 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівка молодого пагона напівлідкрита. Колір верхнього боку листкової пластинки молодого листка світлий мідно-червоний. Пагін напівпрямий, колір дорсальної (добре освітленої) вентральної (без прямого попадання денного світла) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, вони дуже короткі. Квітка має добре розвинуті тичинки і маточку. Розвинений листок середнього розміру округлий, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листкових вирізів закриті, біля черешка - широко відкриті. Зубці довгі, один бік випуклий, другий - увігнутий. Черешок трохи довший за головну жилку. Гроно середнього розміру, середньо щільне, ніжка - коротка. Ягода середня за розміром, широко-еліптична, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка жовто-зелена середньої товщини. М'якоть соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілій пагін темно-коричневий борознистий.

\* Дані заявитника

\*Сорт технічного напряму використання, пізньостиглий, у середньому 142 дні від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Стійкий до філоксери, міldью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 126 ц/га, середня маса грона – 172 г, середня маса 100 ягід – 223 г. Цукристість – 24,9 %, кислотність – 8,6 г/л. Вихід соку (сусла) 65 %. Зимостійкість середня. Має мускатний аромат. Рекомендовано використовувати для виготовлення ігристих (шампанських), сухих та міцних вин, дієтичних соків у 2-ї виноградарській зоні України.

\* Дані заявитника.

## ® 84073003 Таїр

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

\* Сорт столового напряму використання, ранньостиглий, 133 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Верхівка молодого пагона напівлідкрита. Колір верхнього боку пластинки молодого листка жовто-зелений. Колір дорсальної (добре освітленої) частини міжвузлів пагона - зелений із червоними смугами, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше 3. Листок великий трилатеватий, слабкорозсічений згорнутий всередину. Гроно дуже велике нещільне. Ягода дуже велика яйцеподібна чорно-синя, соковита, тверда. Насіння повноцінне. Основне забарвлення здерев'янілого пагона темно-коричневе, поверхня боріздчаста.

\* Дані заявитника.

\*Стійкий до міldью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 99,3 ц/га, з куща - 3,4 кг, середня маса грона - 316 г, середня маса 100 ягід – 443 г. Цукристість - 16,3 %, кислотність – 8,2 г/л. Транспорtabельний.

Рекомендовано використовувати у 2,6,8,9,11,13,14-ї виноградарських зонах України.

\* Дані заявитника.

## ® 00073005 Чорна опіана

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

\*Сорт дуже пізньостиглий технічного напряму використання, у середньому 174 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розпускаються пізно. Верхівка молодого пагона повністю відкрита. Верхній бік листкової пластинки жовто-зелений. Положення пагона у просторі напівпряме, колір дорсальної (добре освітленої) частини міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), центральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середнього розміру п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Липаті верхніх листкових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Верхні листкові вирізи глибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки випуклі. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Гроно середнє за розміром щільне, ніжка - довга. Грана часто подвійні. Ягода середнього розміру еліптична, важко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорносинього кольору дуже товста. М'якоть малосоковита, тверда. Ягоди з ароматом мускату. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий ребристий.

\*Дані заявника.

\*Стікий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 160 ц/га, середня маса грана – 295 г, середня маса 100 ягід – 348 г. Цукристість – 30,8 %, кислотність – 5,6 г/л. Вихід соку (сусла) 65 %. Зимостійкість середня. Десертне вино світло-рубинового забарвлення. Ягоди з ароматом мускату. Рекомендовано використовувати у 6-ї виноградарській зоні України.

\*Дані заявника.

## ® 97073010 Ялтинський безнасінний

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

\*Сорт столового напряму використання середньостиглий, 145 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Колір дорсальної (добре освітленої) і центральної (без прямого попадання денного світла) частини міжвузлів пагона - зелений із червоними штрихами (смугами). Листок великий 7-лопатевий, пластинка п'ятикутна. Верхні листкові вирізи (між лопатями листка) - глибокі. Верхні лопаті листкових вирізів сильно перекривають одна одну, біля черешка - злегка перекривають одна одну. Гроно середнє за розміром нещільне. Ягода дрібна широкоеліптична, колір шкірки фіолетово-червоний. М'якоть м'яка, соковита. Насінняrudimentарне.

\* Дані заявника.

\*Сорт столового напряму використання, середньостиглий, 145 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стікий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 139 ц/га, середня маса грана – 350 г, середня маса 100 ягід – 241 г. Цукристість – 16,3 %, кислотність – 7,4 г/л. Вихід товарних грон 96 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано використовувати у 6-ї виноградарській зоні України.

\* Дані заявника.