

\*Сорт дуже пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 174 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розпускаються пізно. Верхівка молодого пагона повністю відкрита. Верхній бік листової пластинки жовто-зелений. Положення пагону у просторі напівпряме, колір дорсальної (добре освітленої) частини міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середнього розміру п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Листі верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Верхні листові вирізи глибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки випуклі. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Гроно середнє за розміром щільне, ніжка - довга. Грона часто подвійні. Ягода середнього розміру еліптична, важко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору дуже товста. М'якоть малосоковита, тверда. Ягоди з ароматом мускату. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий ребристий.

\*Дані заявника.

\*Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 160 ц/га, середня маса грона – 295 г, середня маса 100 ягід – 348 г. Цукристість – 30,8 %, кислотність – 5,6 г/л. Вихід соку (сусла) 65 %. Зимостійкість середня. Десертне вино світло-рубинового забарвлення. Ягоди з ароматом мускату. Рекомендовано використовувати у 6-ій виноградарській зоні України.

\*Дані заявника.

### ® 97073010 Ялтинський безнасінний

**Заявник:** Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

\*Сорт столового напрямку використання середньостиглий, 145 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Колір дорсальної (добре освітленої) і вентральної (без прямого попадання денного світла) частини міжвузлів пагона - зелений із червоними штрихами (смугами). Листок великий 7-лопатовий, пластинка п'ятикутна. Верхні листові вирізи (між лопатями листка) - глибокі. Верхні лопаті листових вирізів сильно перекривають одна одну, біля черешка - злегка перекривають одна одну. Гроно середнє за розміром нещільне. Ягода дрібна широкоеліптична, колір шкірки фіолетово-червоний. М'якоть м'яка, соковита. Насіння рудиментарне.

\* Дані заявника.

\*Сорт столового напрямку використання, середньостиглий, 145 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 139 ц/га, середня маса грона – 350 г, середня маса 100 ягід – 241 г. Цукристість – 16,3 %, кислотність – 7,4 г/л. Вихід товарних грон 96 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано використовувати у 6-ій виноградарській зоні України.

\* Дані заявника.