

- 4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)
- 5 Продуктивність обрізання (шт)
- 6 Розмір квітки (см)
- 7 Оцінка сорту (б)
- 8 Стан під час масового цвітіння (б)
- 9 Борошниста роса (%)
- 10 Діаметр качана (мм)
- 11 Довжина квітконосу (см)
- 12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)
- 13 Зимостійкість (б)
- 14 Процент укорінення живців (ц/га0

® 06246003 Лексані

Заявник: Лекс Воорн Розенверделінк Б.В.

Власник(и): Лекс Воорн Розенверделінк Б.В.

Підтримувач(і):

Габітус рослини вузькокущовий, антоціанове забарвлення молодих пагонів дуже слабке, забарвлення листка світло-зелене глянцеуватість помірна, діаметр квітки середній вигляд квітки зверху зіркоподібна, пелюстка: колір середньої зони внутрішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір крайової зони внутрішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір плями на основі внутрішньої сторони RHS 2Д, пелюстка: колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 155B

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	50
2 Висота рослини (см)	70
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	2500
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	50
5 Продуктивність обрізання (шт)	250
6 Розмір квітки (см)	5
7 Оцінка сорту (б)	9
8 Стан під час масового цвітіння (б)	9
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	
11 Довжина квітконосу (см)	60
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	14
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	100

® 06246007 Олійредсп

Заявник: Олій Інновейшн БВ

Власник(и): Олій Інновейшн БВ

Підтримувач(і):

Габітус вузькокущовий. Молоді пагони мають слабке антоціанове забарвлення, на пагонах наявні шипи, середня кількість, забарвлення листка помірно до темного, листочок у поперечному розтині увігнутий, кінцевий листочок за формою основи заокруглений, тип квітки - повна, вигляд квітки

зверху - неправильноокругла. Пелюстка колір середньої зони внутрішньої сторони за шкалою RHS 44 B, пелюстка колір крайової зони внутрішньої сторони за шкалою RHS 46 B, пелюстка колір плями на основі внутрішньої сторони RHS 6A, пелюстка колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 44B, пелюстка колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 44 B. Увігнутість краю пелюстки від помірної до сильної, хвилястість краю слабка.

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	30
2 Висота рослини (см)	70
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	2200
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	40
5 Продуктивність обрізання (шт)	150
6 Розмір квітки (см)	6
7 Оцінка сорту (б)	8
8 Стан під час масового цвітіння (б)	8
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	20
11 Довжина квітконосу (см)	55
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	12
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	75

® 05246012 Селаурум

Заявник: Терра Нігра Холдінг Б.В.

Власник(и): Терра Нігра Холдінг Б.В.

Підтримувач(и):

Габітус рослини вузькокущовий, листок за розміром середній, помірна глянцеуватість верхньої сторони, листок у попечному розтині плоский, хвилястість краю слабка, тип квітки повна, квітка за діаметром велика, вигляд квітки зверху зіркоподібна, слабкий аромат, колір пелюстки середньої зони внутрішньої сторони RHS45A, колір пелюстки крайової зони внутрішньої сторони RHS45A, колір плями на основі внутрішньої сторони RHS13A, колір середньої зони зовнішньої сторони RHS46 A, колір крайової зони зовнішньої сторони RHS45A, колір плями на основі зовнішньої сторони RHS5A

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	23
2 Висота рослини (см)	100
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	3500
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	70
5 Продуктивність обрізання (шт)	18
6 Розмір квітки (см)	12
7 Оцінка сорту (б)	8
8 Стан під час масового цвітіння (б)	8
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	
11 Довжина квітконосу (см)	
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	12
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	75