

® 06246005 Тан01994

Заявник: Розен Тантау. Матиас Тантау Нахфольгер

Власник(и): Розен Тантау. Матиас Тантау Нахфольгер

Підтримувач(і):

Габитус вузькокущовий. Молоді пагони мають сильне антоціанове забарвлення, на пагонах наявні шипи, середня кількість, забарвлення листка помірно до темного, Листочок у поперечному розтині увігнутий, кінцевий листочок за формою основи заокруглений, тип квітки - повна, Вигляд квітки зверху - зіркоподібна. Пелюстка колір середньої зони внутрішньої сторони за шкалою RHS 46 A та 46 B, пелюстка колір крайової зони внутрішньої сторони за шкалою RHS 46 A та 46 B, пелюстка колір плями на основі внутрішньої сторони RHS 4, пелюстка колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 57A, пелюстка колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 57 та RHS 57 C. Увігнутість краю пелюстки від помірної до сильної, хвилястість краю слабка.

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	35
2 Висота рослини (см)	120
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	2500
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	90
5 Продуктивність обрізання (шт)	245
6 Розмір квітки (см)	8
7 Оцінка сорту (б)	8
8 Стан під час масового цвітіння (б)	8
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	15
11 Довжина квітконосу (см)	100
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	12
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	100

Шавлія лікарська

® 05203001 Бужеле

Заявник: Херсонський державний аграрний університет

Власник(и): Херсонський державний аграрний університет

Підтримувач(і):

*Сорт середньостиглий. Сім'ядольні листки темно-зеленого забарвлення дрібні. Рослина висока, куц компактний. Корінь і кореневище темно-бурого забарвлення середньої товщини. Листок середнього розміру темно-зеленого забарвлення. Стебло без опушення із антоціановим забарвленням. Пелюстки квітки (перед розкриттям) бузкового кольору.

* Дані заявника.

*Середня врожаність сухої наземної маси 33,4 ц/га, насіння - 3,3 кг/га. Маса 1000 насінин 8,2 г. Стійкість до хвороб і шкідників середня. Вміст ефірної олії у сухій масі 1,7 %, збір - 32,2 кг/га. Ефірна олія містить: d-a -пинену - 3,9 %, борнеолу - 8,7 %, камфори - 8,1 %. Рекомендовано для зон Степу та Лисостепу України.

* Дані заявника.