

## Сільськогосподарські: круп'яні

### Гречка

#### **05002001 Амазонка**

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Сорт диплоїдний. Рослина за габітусом слаборозлого типу, висока (більше 91-110 см), з середньою кількістю гілок (4-6), має середні час настання масового цвітіння (26-32 доби) та досягнення (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла) стосовно висоти гілок знаходиться рівні гілок. Пагін слаборебристий, на третьому вузлі - товстий, з середніми зонами галуження та плодоутворення, має середню кількість вузлів у зоні галуження.

Квітка - середня за розміром, має блідо-червоний колір піляків, грибоподібну форму нектарників та середньо ароматизована.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: має середньої довжини квітконос, вузькоциліндричну форму середньої щільноти та середню його довжину.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні - щиток, який має більше трьох китиць середньої довжини.

Плід довгий, середньої ширини, краплеподібної форми з середніми крилами, має середню довжину. Оплодень плоду зеленого кольору на час наливу, а за повного досягнення стає світло-коричневим з наявними дрібними крапками та слабким восковим нальотом на ньому. Форма граней плоду - плеската, верхівки - гостра з середнім ступенем вираженням основи.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середніми показниками вирівняності та плівчастості.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Лісостепу - 17,9 ц/га. Вегетаційний період 92 доби. Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білку становить 14,9%, крупність ядра - 53,7%, плівчастість - 23,6%, вихід крупи - 71,0%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добре результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

#### **05002003 Ювілейна 100**

**Заявник:** Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Сорт диплоїдний. Рослина за габітусом компактна, детермінантного типу, дуже висока (більше 110 см), з середньою кількістю гілок (4-6), має середні час настання масового цвітіння (26-32 доби) та досягнення (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла) стосовно висоти гілок знаходитьться вище. Головний пагін - слабо ребристий, на третьому вузлі - товстий, з середньою зоною галуження та довгою зоною плодоутворення, має такі середні показники: кількість вузлів у зоні галуження, висоту прикріплень першої гілки та першого суцвіття.

Пагони з майже суцільним антоціановим забарвленням середньої інтенсивності. Вузли пагонів добре виражені, темно-зеленого кольору. Опушенні первих двох вузлів середньої інтенсивності.

Третій листок має середні довжину, ширину та розмір. Листкова пластинка має середню товщину, слабо хвиляста, серцевиднотрикутна, зеленого кольору, зі слабовираженою антоціановою плямою біля основи та слабочервоним забарвленням жилок біля неї, слабким опушеннем жилок з нижнього боку та нещільними волосками на жилках.

Квітка - середнього розміру, гомостильного типу з блідо- рожевим кольором оцвітини та видовженою формою її листочків, роташування яких відокремлене. Квітка має блідо-червоний колір піляків, овальну форму нектарників та слабкий аромат.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: має середньої довжини квітконос, вузькоциліндричну форму середньої щільності та середню його довжину.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні - щиток, який складається з трьох китиць середньої довжини.

Плід - середніх розмірів (довжина та ширина), краплеподібної форми з малими крилами, має середні довжину та товщину плодоніжки. Оплодень плоду блідо-зеленого кольору на час наливу, а за повного досягнення стає темно-сірим з наявними дрібними крапками та помірним восковим нальотом на ньому. Форма граней плоду - плескати, а верхівки - коротка з помірним ступенем вираженням основи.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середніми показниками вирівняності та плівчастості.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Полісся - 17,9 ц/га. Гарантована прибавка - 1,0 ц/га. Вегетаційний період - 97 діб.

Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білка становить 16,9%, крупність ядра - 39,0%, плівчастість - 23,7%, вихід крупи - 71,3%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добре результати дає при внесенні повного мінерального живлення

## Прoso

### **05006002 Вітрило**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Рослина висока, із середньою кількістю вузлів на головному стеблі, має пізній час викидання волоті.

Листки без антоціанового забарвлення, відносно стебла слабко - похилені. Прапорцевий листок має середні показники довжини та ширини.

Верхнє міжузля - коротке, товсте.

Волоть - стиснута, довга, вузька, з відхиленими в 2-х напрямках гілочками, нещільна. Гілочки першого порядку середньої довжини, зі слабким ступенем звисання. Подушечки на гілочках виражені тільки у гілочок 1-го та 2-го порядків.

Колосок має еліптичну форму, жовтий. Колоскові луски без антоціанового забарвлення. Приймочка маточки - фіолетова.

Зернівка - середнього розміру, майже кулястої форми. Квіткові луски - жовті, грубі. Ядро (нешліфоване) також жовте. Плацентна пляма ядра - коричнева.

Маса 1000 зерен – велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу становила 31,3 ц/га. Гарантована прибавка - 2,6 ц/га. Вегетаційний період 87 діб.

Сорт стійкий до хвороб, бактеріальної плямистості, сажки. Стійкий до посухи, осипання, полягання. Вміст білка - 14,8%, вихід крупи - 76,5%, плівчатість - 18,3%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.

### **05006001 Олітан**

**Заявник:** Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Рослина середньої висоти, із середньою кількістю вузлів на головному стеблі, має середній час викидання волоті.

Листки з антоціаном, відносно стебла слабко - похилені. Прапорцевий листок має середні показники довжини та ширини.

Верхнє міжузля середньої довжини, товсте.

Волоть - розлога, дуже довга, середньої ширини, із відхиленими в усі сторони гілочками, нещільна. Гілочки першого порядку довгі, з середнім ступенем звисання . Подушечки на гілочках виражені до 1/2 волоті.