

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: має середньої довжини квітконос, вузькоциліндричну форму середньої щільності та середню його довжину.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні - щиток, який складається з трьох китиць середньої довжини.

Плід - середніх розмірів (довжина та ширина), краплеподібної форми з малими крилами, має середні довжину та товщину плодоніжки. Оплідень плоду блідо-зеленого кольору на час наливу, а за повного досягання стає темно-сірим з наявними дрібними крапками та помірним восковим нальотом на ньому. Форма граней плоду - плеската, а верхівки - коротка з помірним ступенем вираженням основи.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середніми показниками вирівняності та плівчатості.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Полісся - 17,9 ц/га. Гарантована прибавка - 1,0 ц/га. Вегетаційний період - 97 дб.

Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білка становить 16,9%, крупність ядра - 39,0%, плівчатість - 23,7%, вихід крупи - 71,3%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення

Просо

05006002 Вітрило

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина висока, із середньою кількістю вузлів на головному стеблі, має пізній час викидання волоті.

Листки без антоціанового забарвлення, відносно стебла слабко - похилені. Прапорцевий листок має середні показники довжини та ширини.

Верхнє міжвузля - коротке, товсте.

Волоть - стиснута, довга, вузька, з відхиленими в 2-х напрямках гілочками, нещільна. Гілочки першого порядку середньої довжини, зі слабким ступенем звисання. Подушечки на гілочках виражені тільки у гілочок 1-го та 2-го порядків.

Колосок має еліптичну форму, жовтий. Колоскові луски без антоціанового забарвлення. Приймочка маточки - фіолетова.

Зернівка - середнього розміру, майже кулястої форми. Квіткові луски - жовті, грубі. Ядро (нешліфоване) також жовте. Плацентна пляма ядра - коричнева.

Маса 1000 зерен - велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу становила 31,3 ц/га. Гарантована прибавка - 2,6 ц/га. Вегетаційний період 87 дб.

Сорт стійкий до хвороб, бактеріальної плямистості, сажки. Стійкий до посухи, осипання, полягання. Вміст білка - 14,8%, вихід крупи - 76,5%, плівчатість - 18,3%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.

05006001 Олітан

Заявник: Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої висоти, із середньою кількістю вузлів на головному стеблі, має середній час викидання волоті.

Листки з антоціаном, відносно стебла слабко - похилені. Прапорцевий листок має середні показники довжини та ширини.

Верхнє міжвузля середньої довжини, товсте.

Волоть - розлога, дуже довга, середньої ширини, із відхиленими в усі сторони гілочками, нещільна. Гілочки першого порядку довгі, з середнім ступенем звисання. Подушечки на гілочках виражені до 1/2 волоті.