

Сільськогосподарські: олійні та прядивні**Соняшник****04017070 Айдар**

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - помірною. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, зубці та вушка - помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галушення відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,7 ц/га, гарантована прибавка - 1,1 ц/га, у зоні Лісостепу - середня урожайність - 29,4 ц/га, гарантована прибавка - 4,1 ц/га. Потенційна урожайність - 50,1 ц/га. Вміст жиру - 49,1-51,2%, білка - 16,0-17,3%, вихід олії - 1274-1549 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017078 Аріадна Євраліс

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середня за висотою, галушення відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,8 ц/га, гарантована прибавка 3,2 ц/га, у зоні Лісостепу - середня урожайність 28,1 ц/га, гарантована прибавка 2,8 ц/га. Потенційна урожайність 44,4 ц/га. Вміст жиру 48,8-49,9%, олеїнової кислоти 82,8%, білку 16,3-17,2%, вихід олії 1304-1435 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017016 Блейзер

Заявник: Сідс 2000

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-

яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галушення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка 5,5 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,7 ц/га, гарантована прибавка 4,8 ц/га. Потенційна урожайність 47,8 ц/га. Вміст жиру 49,2-51,9%, олеїнової кислоти 55,8%, білку 15,3-16,4%, вихід олії 1344-1476 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017065 Базальт

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великий з слабкою пухирчатістю, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, довгі помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галушення відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,6 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,0%, білку 16,3-17,0%, вихід олії 1460-1656 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017065 Базальт

Заявник: Закрите акціонерне товариство " Селена"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великий з слабкою пухирчатістю, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, довгі помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галушення відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,6 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,0%, білку 16,3-17,0%, вихід олії 1460-1656 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

® 04017044 Босць

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук