

яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галушення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка 5,5 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,7 ц/га, гарантована прибавка 4,8 ц/га. Потенційна урожайність 47,8 ц/га. Вміст жиру 49,2-51,9%, олеїнової кислоти 55,8%, білку 15,3-16,4%, вихід олії 1344-1476 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **05017065 Базальт**

**Заявник:** Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великий з слабкою пухирчатістю, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, довгі помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галушення відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,6 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,0%, білку 16,3-17,0%, вихід олії 1460-1656 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **05017065 Базальт**

**Заявник:** Закрите акціонерне товариство " Селена"

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великий з слабкою пухирчатістю, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, довгі помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галушення відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,6 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,0%, білку 16,3-17,0%, вихід олії 1460-1656 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **® 04017044 Босць**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук