

яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка 5,5 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,7 ц/га, гарантована прибавка 4,8 ц/га. Потенційна урожайність 47,8 ц/га. Вміст жиру 49,2-51,9%, олеїнової кислоти 55,8%, білку 15,3-16,4%, вихід олії 1344-1476 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017065 Базальт

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великий з слабкою пухирчатістю, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, довгі помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галузнення відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,6 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,0%, білку 16,3-17,0%, вихід олії 1460-1656 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017065 Базальт

Заявник: Закрите акціонерне товариство " Селена"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великий з слабкою пухирчатістю, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, довгі помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галузнення відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,6 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,0%, білку 16,3-17,0%, вихід олії 1460-1656 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

® 04017044 Босць

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий, пухирчастість помірна, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузько яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила - 27,6 ц/га, гарантована прибавка - 2,3 ц/га. Потенційна урожайність - 49,0 ц/га. Вміст жиру - 50,0%, білка - 16,8%, вихід олії - 1314 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

® 04017047 Богун

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий, пухирчатість помірна, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середній, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га. Потенційна урожайність 46,5 ц/га. Вміст жиру 50,0%, олеїнової кислоти 60,5%, білку 16,2%, вихід олії 1636 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017053 Гайдук

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має сильне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опущення верхівки стебла відсутнє або дуже слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, злегка випуклий. Положення кошика обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 25,3 ц/га, гарантована прибавка - 2,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 27,0 ц/га, гарантована прибавка - 3,1 ц/га. Потенційна урожайність - 42,6 ц/га. Вміст жиру - 48,0-49,8%, білку - 15,6-16,1%, вихід олії - 1276-1365 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017041 Доріана

Заявник: КВС ЗААТ АГ