

04017057 Кошовий

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок великий за розміром з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовті, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Форма зовнішніх листків обгортки чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом з стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 24,8 ц/га, гарантована прибавка - 2,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 27,2 ц/га, гарантована прибавка - 3,4 ц/га. Потенційна урожайність - 42,8 ц/га. Вміст жиру - 48,2-51,7%, білка - 17,4-18,6%, вихід олії - 1237-1459 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017030 Кандела

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість та зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик плесканий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 27,2 ц/га, гарантована прибавка 0,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,3 ц/га, гарантована прибавка 1,0 ц/га. Потенційна урожайність 45,4 ц/га. Вміст жиру 50,8-51,4%, білку 15,8-16,2%, вихід олії 1406-1522 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

® 04017045 Квін

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має сильне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великий, пухирчастість та вушка помірні, зубці дрібні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,3 ц/га, гарантована прибавка - 0,7 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 28,3 ц/га, гарантована прибавка - 3,0 ц/га. Потенційна урожайність - 53,0 ц/га. Вміст жиру - 49,9-50,8%, білка - 16,0-17,1%, вихід олії - 1308-1418 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017052 Капрал

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість та зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 25,8 ц/га, гарантована прибавка 0,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,5 ц/га, гарантована прибавка 2,2 ц/га. Потенційна урожайність 47,1 ц/га. Вміст жиру 50,0-51,0%, пальмітинової кислоти 20,1%, білку 15,6-16,4%, вихід олії 1322-1392 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017011 Коралія КС

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушення верхівки стебла слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,1 ц/га, гарантована прибавка 2,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,9 ц/га, гарантована прибавка 4,4 ц/га. Потенційна урожайність 43,9 ц/га. Вміст жиру 52,4%, білку 15,6%, вихід олії 1614 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017072 Лиман

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість та зубці помірні, вушка - дуже великі. Форма поперечного розрізу листка - сильно увігнута. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно - зеленого