

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,3 ц/га, гарантована прибавка - 0,7 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 28,3 ц/га, гарантована прибавка - 3,0 ц/га. Потенційна урожайність - 53,0 ц/га. Вміст жиру - 49,9-50,8%, білка - 16,0-17,1%, вихід олії - 1308-1418 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **05017052 Капрал**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість та зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формує чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика напіввернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 25,8 ц/га, гарантована прибавка 0,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,5 ц/га, гарантована прибавка 2,2 ц/га. Потенційна урожайність 47,1 ц/га. Вміст жиру 50,0-51,0%, пальмітинової кислоти 20,1%, білку 15,6-16,4%, вихід олії 1322-1392 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **06017011 Коралія КС**

**Заявник:** Кассад Семанс

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формує чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,1 ц/га, гарантована прибавка 2,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,9 ц/га, гарантована прибавка 4,4 ц/га. Потенційна урожайність 43,9 ц/га. Вміст жиру 52,4%, білку 15,6%, вихід олії 1614 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **04017072 Лиман**

**Заявник:** Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість та зубці помірні, вушка - дуже великі. Форма поперечного розрізу листка - сильно увігнута. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно - зеленого

кольору, за формою - чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 26,4 ц/га, гарантована прибавка 0,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,5 ц/га, гарантована прибавка 3,2 ц/га. Потенційна урожайність 51,8 ц/га. Вміст жиру 50,6-51,8%, олеїнової кислоти 72,0%, білку 15,6-16,8%, вихід олії 1374-1478 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **04017017 ЛГ 5412**

**Заявник:** Лімагрейн Вернеуль Холдінг

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,1 ц/га, гарантована прибавка 1,1 ц/га. Потенційна урожайність 46,6 ц/га. Вміст жиру 51,4%, білку 16,9%, вихід олії 1500 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **05017069 ЛГ 5669КЛ**

**Заявник:** Лімагрейн Вернеуль Холдінг

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опущення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик великий, плескатої форми. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,0 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,8 ц/га, гарантована прибавка 4,3 ц/га. Потенційна урожайність 46,5 ц/га. Вміст жиру 48,8-50,8%, білку 15,6-16,6%, вихід олії 1348-1672 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **05017071 ЛГ 5450**

**Заявник:** Лімагрейн Вернеуль Холдінг

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма