

кольору, за формою - чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 26,4 ц/га, гарантована прибавка 0,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,5 ц/га, гарантована прибавка 3,2 ц/га. Потенційна урожайність 51,8 ц/га. Вміст жиру 50,6-51,8%, олеїнової кислоти 72,0%, білку 15,6-16,8%, вихід олії 1374-1478 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **04017017 ЛГ 5412**

**Заявник:** Лімагрейн Вернеуль Холдінг

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірньо-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,1 ц/га, гарантована прибавка 1,1 ц/га. Потенційна урожайність 46,6 ц/га. Вміст жиру 51,4%, білку 16,9%, вихід олії 1500 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **05017069 ЛГ 5669КЛ**

**Заявник:** Лімагрейн Вернеуль Холдінг

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опущення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірньо-жовтого кольору, вузько- яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірньо-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик великий, плескатої форми. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,0 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,8 ц/га, гарантована прибавка 4,3 ц/га. Потенційна урожайність 46,5 ц/га. Вміст жиру 48,8-50,8%, білку 15,6-16,6%, вихід олії 1348-1672 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **05017071 ЛГ 5450**

**Заявник:** Лімагрейн Вернеуль Холдінг

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма