

поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,2 ц/га, гарантована прибавка 1,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,5 ц/га, гарантована прибавка 1,2 ц/га. Потенційна урожайність 44,0 ц/га. Вміст жиру 49,8-51,8%, білку 15,2-16,2%, вихід олії 1402-1659 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017093 МН 5319

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовті, веретеновидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, верхівка за довжиною середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом з легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 32,6 ц/га, гарантована прибавка - 7,0 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 31,1 ц/га, гарантована прибавка- 5,9 ц/га. Потенційна урожайність - 46,6 ц/га. Вміст жиру - 49,5-51,4%, білка - 15,8-16,9%, вихід олії - 1420-1655 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017015 Мальком

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(и):

Антоціанове забарвлення гіпокотилію відсутнє. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабок. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовті, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом з прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) плеската. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 28,7 ц/га, гарантована прибавка - 5,7 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 32,7 ц/га, гарантована прибавка - 8,8 ц/га. Вміст жиру - 49,4-50,0%, білка - 17,0-18,6%, вихід олії - 1237-1438 кг/га. Потенційна урожайність - 49,5 ц/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.