

розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 33,7 ц/га, гарантована прибавка 7,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 32,9 ц/га, гарантована прибавка 5,4 ц/га. Потенційна урожайність 51,3 ц/га. Вміст жиру 50,0-50,9%, білку 16,5-17,0%, вихід олії 1474-1521 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017007 НПК 1207

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва Приватна Компанія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки світло зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 28,0 ц/га, гарантована прибавка - 2,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 29,2 ц/га, гарантована прибавка - 4,0 ц/га. Потенційна урожайність - 40,0 ц/га. Вміст жиру - 50,0-50,2%, білка - 16,2-16,9%, вихід олії - 1464-1500 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017001 НК Кантрі

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла відсутнє або дуже слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки короткі, щільні, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, великий. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,4 ц/га, гарантована прибавка 2,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 33,4 ц/га, гарантована прибавка 6,9 ц/га. Потенційна урожайність 41,7 ц/га. Вміст жиру 48,2-49,0%, олеїнової кислоти 86,9%, білку 17,3-18,4%, вихід олії 1554-1688 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017006 НК Камен

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка

помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середня за висотою, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 32,3 ц/га, гарантована прибавка 5,8 ц/га. Потенційна урожайність 49,3 ц/га. Вміст жиру 48,8-50,4%, білку 16,7-17,4%, вихід олії 1446-1497 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017090 Оллеан

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка малі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки короткі, середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжеві. Форма зовнішніх листків обгортки чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, видовженої форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,0 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 33,1 ц/га, гарантована прибавка 5,6 ц/га. Потенційна урожайність 45,4 ц/га. Вміст жиру 50,8-51,4%, білку 16,0-16,7%, вихід олії 1629-1729 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

03017005 Орасол

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьюрл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик плескатий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,3 ц/га, гарантована прибавка 3,7 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,8 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Потенційна урожайність 42,1 ц/га. Вміст жиру 49,0-49,9%, олеїнової кислоти 70,4%, білку 17,0-17,9%, вихід олії 1225-1345 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017066 Персей

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"