

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,3 ц/га, гарантована прибавка 2,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 31,8 ц/га, гарантована прибавка 6,5 ц/га. Потенційна урожайність 47,9 ц/га. Вміст жиру 48,4-49,5%, олеїнової кислоти 84,4%, білку 16,4-17,3%, вихід олії 1422-1485 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017015 ПСФ 4639

Заявник: Сідс 2000

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середня за висотою, галуження відсутнє. Кошик малий, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,8 ц/га, гарантована прибавка 6,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 31,9 ц/га, гарантована прибавка 8,0 ц/га. Потенційна урожайність 48,9 ц/га. Вміст жиру 49,4-50,1%, олеїнової кислоти 80,2%, білку 15,8-16,9%, вихід олії 1406-1597 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017060 Румбасол ОР

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,7 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га. Потенційна урожайність 46,3 ц/га. Вміст жиру 50,6%, білку 16,0%, вихід олії 1447 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

03017029 Ригасол ОР

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок за розміром великий, пухирчатість відсутня, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні