

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,3 ц/га, гарантована прибавка 2,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 31,8 ц/га, гарантована прибавка 6,5 ц/га. Потенційна урожайність 47,9 ц/га. Вміст жиру 48,4-49,5%, олеїнової кислоти 84,4%, білку 16,4-17,3%, вихід олії 1422-1485 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017015 ПСФ 4639

Заявник: Сідс 2000

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формує чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середня за висотою, галуження відсутнє. Кошик малий, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,8 ц/га, гарантована прибавка 6,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 31,9 ц/га, гарантована прибавка 8,0 ц/га. Потенційна урожайність 48,9 ц/га. Вміст жиру 49,4-50,1%, олеїнової кислоти 80,2%, білку 15,8-16,9%, вихід олії 1406-1597 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017060 Румбасол ОР

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьюрл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні листки обгортки за формує чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,7 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га. Потенційна урожайність 46,3 ц/га. Вміст жиру 50,6%, білку 16,0%, вихід олії 1447 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

03017029 Ригасол ОР

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьюрл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок за розміром великий, пухирчастість відсутня, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні

листки обгортки за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом з стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 25,1 ц/га, у зоні Лісостепу -24,7 ц/га. Потенційна урожайність - 44,7 ц/га. Вміст жиру - 48,0-48,6%, білка - 17,0-17,4%, вихід олії - 1395-1652 кг/га. Стікий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017012 Рейна

Заявник: Мей АгроСід Корпорейшн (Мей АгроТохумсулук Санай ве Тісарапт А.С)

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотиллю. Листок середній, пухирчастість слабка, зубці грубі, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільноти, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка коротка. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 27,8 ц/га, гарантована прибавка - 4,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 29,2 ц/га, гарантована прибавка - 5,32 ц/га. Потенційна урожайність - 43,4 ц/га. Вміст жиру - 48,2-49,1%, білка - 16,1-17,7%, вихід олії - 1237-1528 кг/га. Стікий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017023 Спіру

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотиллю. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, плескатий. Положення кошика обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,1 ц/га, гарантована прибавка - 3,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 29,7 ц/га, гарантована прибавка - 5,8 ц/га. Потенційна урожайність - 40,6 ц/га. Вміст жиру - 48,5-50,0%, білку - 16,4-18,4%, вихід олії - 1255-1626 кг/га. Стікий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017071 Степок

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Власник(и):

Підтримувач(и):