

листки обгортки за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом з стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 25,1 ц/га, у зоні Лісостепу - 24,7 ц/га. Потенційна урожайність - 44,7 ц/га. Вміст жиру - 48,0-48,6%, білка - 17,0-17,4%, вихід олії - 1395-1652 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017012 Рейна

Заявник: Мей Агро Сід Корпорейшн ((Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С)

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середній, пухирчастість слабка, зубці грубі, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка коротка. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 27,8 ц/га, гарантована прибавка - 4,8 ц/га, у зоні Лісостепу - середня урожайність - 29,2 ц/га, гарантована прибавка - 5,32 ц/га. Потенційна урожайність - 43,4 ц/га. Вміст жиру - 48,2-49,1%, білка - 16,1-17,7%, вихід олії - 1237-1528 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017023 Спіру

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опущення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, плескатий. Положення кошика обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,1 ц/га, гарантована прибавка - 3,4 ц/га, у зоні Лісостепу - середня урожайність - 29,7 ц/га, гарантована прибавка - 5,8 ц/га. Потенційна урожайність - 40,6 ц/га. Вміст жиру - 48,5-50,0%, білку - 16,4-18,4%, вихід олії - 1255-1626 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017071 Степок

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Власник(и):

Підтримувач(і):