

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка 0,3 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,7 ц/га, гарантована прибавка 1,3 ц/га. Потенційна урожайність 40,7 ц/га. Вміст жиру 51,0-52,1%, білку 15,9-16,8%, вихід олії 1458-1473 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **06017059 Форте ОР**

**Заявник:** Монсанто Інтернешнл Сьорл

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла відсутнє або дуже слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка за довжиною коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом з стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 30,9 ц/га, гарантована прибавка - 4,4 ц/га. Потенційна урожайність - 42,0 ц/га. Вміст жиру - 50,3%, білка - 16,7%, вихід олії - 1548 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **05017053 Форвард**

**Заявник:** Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок малий, пухирчастість помірна, зубці дрібні, вушка дуже великі. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушення верхівки стебла слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 29,2 ц/га, гарантована прибавка - 3,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 31,1 ц/га, гарантована прибавка - 5,8 ц/га. Потенційна урожайність - 48,7 ц/га. Вміст жиру - 50,0-50,8%, білка - 15,4-16,2%, вихід олії - 1368-1475 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### **06017010 Фабіола КС**

**Заявник:** Кассад Семанс