

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільноти, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формуою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка 0,3 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,7 ц/га, гарантована прибавка 1,3 ц/га. Потенційна урожайність 40,7 ц/га. Вміст жиру 51,0-52,1%, білку 15,9-16,8%, вихід олії 1458-1473 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017059 Форте ОР

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьюрл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла відсутнє або дуже слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільноти, помірно жовті, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні листки обгортки за формуою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка за довжиною коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом з стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 30,9 ц/га, гарантована прибавка - 4,4 ц/га. Потенційна урожайність - 42,0 ц/га. Вміст жиру - 50,3%, білка - 16,7%, вихід олії - 1548 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017053 Форвард

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок малий, пухирчастість помірна, зубці дрібні, вушка дуже великі. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільноти, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формуою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 29,2 ц/га, гарантована прибавка - 3,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 31,1 ц/га, гарантована прибавка - 5,8 ц/га. Потенційна урожайність - 48,7 ц/га. Вміст жиру - 50,0-50,8%, білка - 15,4-16,2%, вихід олії - 1368-1475 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017010 Фабіола КС

Заявник: Кассад Семанс

Власник(i):

292

Підтримувач(i):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, форма чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика - краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 34,5 ц/га, гарантована прибавка - 8,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 33,5 ц/га, гарантована прибавка - 8,2 ц/га. Потенційна урожайність - 50,2 ц/га. Вміст жиру - 51,5-53,2%, білка - 15,8-16,7%, вихід олії - 1568-1820 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017084 Філліа

Заявник: Р2н

Власник(i):

Підтримувач(i):

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опущення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки короткі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за форму чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 29,4 ц/га, гарантована прибавка - 3,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 31,6 ц/га, гарантована прибавка - 6,4 ц/га. Потенційна урожайність - 48,2 ц/га. Вміст жиру - 50,8%, білка - 16,5%, вихід олії - 1532 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017038 Шанс

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Селена"

Власник(i):

Підтримувач(i):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, форма чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,0 ц/га, гарантована прибавка - 0,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 27,4 ц/га, гарантована прибавка - 2,1 ц/га. Потенційна урожайність - 45,8 ц/га. Вміст жиру - 51,3-51,7%, білка - 15,4-15,9%, вихід олії - 1319-1658 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.