

Власник(и):**Підтримувач(і):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 34,5 ц/га, гарантована прибавка - 8,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 33,5 ц/га, гарантована прибавка - 8,2 ц/га. Потенційна урожайність - 50,2 ц/га. Вміст жиру - 51,5-53,2%, білка - 15,8-16,7%, вихід олії - 1568-1820 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017084 Філія**Заявник:** Р2н**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Антоціанове забарвлення гіпокотилу відсутнє. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки короткі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 29,4 ц/га, гарантована прибавка - 3,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 31,6 ц/га, гарантована прибавка - 6,4 ц/га. Потенційна урожайність - 48,2 ц/га. Вміст жиру - 50,8%, білка - 16,5%, вихід олії - 1532 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017038 Шанс**Заявник:** Закрите акціонерне товариство " Селена"**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,0 ц/га, гарантована прибавка - 0,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 27,4 ц/га, гарантована прибавка - 2,1 ц/га. Потенційна урожайність - 45,8 ц/га. Вміст жиру - 51,3-51,7%, білка - 15,4-15,9%, вихід олії - 1319-1658 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.