

Соя

05018012 Ворскла

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з сірим опушенням, середньої висоти, проміжного типу росту, з відсутнім або дуже слабким ступенем завивання стебла, напіввиступаючою формою куща, мають від дуже раннього до раннього як час початку цвітіння, так і досягання з наявним опаданням листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

Листок - помірного зеленого кольору та помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок великий, ланцетної форми з заокругленою формою верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб - серповидної форми, має середні параметри і довжини, і ширини та світло-коричнєве забарвлення.

Насінина округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та наявним рубчиком. Рубчик овальної форми з наявним вічком на ньому, має світло-коричнєве забарвлення. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

Маса 1000 зерен – середня (153,5 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 17,9 ц/га, Лісостепу – 21,6 ц/га. Вміст жиру – 22,4%, білка – 37,2%. Висота прикріплення нижнього бобу – 15,7 см.

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, відносно стійкий до посухи.

06018004 Ентерпрайс

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають індетермінантний тип росту, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранній час і початку цвітіння, і середній досягання з наявним опаданням листя.

Стебло - з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Листок помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - середній, овальної форми та з загостреною формою верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб має серповидну форму, середню довжину, вузький. Забарвлення бобу - коричневе.

Насінина - опукло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини має жовтий колір, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

Маса 1000 насінин - середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу – 28,5 ц/га. Вміст жиру – 23,1 %, білка – 36,3 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 11,4 см. Маса 1000 насінин – 182,8 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

05018021 Іна

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини із сірим опушенням, від середньої до високої висоти, мають проміжний тип росту, середній ступінь завивання стебла, напіврозлогу форму куща, середньоранній час і початку цвітіння, і досягання з наявним опаданням листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

Листок - помірного зеленого кольору та зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - великий, овальної форми та має загострену форму верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб має серповидну форму з середніми параметрами довжини та ширини. Забарвлення бобу - коричневе.

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 22,1 ц/га. Вміст жиру – 23,4 %, білка – 37,4 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 13,9 см. Маса 1000 насінин – 174,4 г

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, відносно стійкий до посухи.

06018003 Колбі

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з сірим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабкий ступінь завивання стебла, напіввстиснуту форму куща, середньоранній час початку цвітіння та пізній досягання з наявним опаданням листя.

Стебло з великою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

Листок - помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - середній, клиноподібний та має загострену форму верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу - коричневе.

Насінина - овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

Маса 1000 зерен – велика.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу – 25,9 ц/га. Вміст жиру – 21,2 %, білка – 37,5 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 17,9 см. Маса 1000 насінин – 196,1 г

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, відносно стійкий до посухи.