

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 13040034 Назва сорту: Параллак **Заявник (код):** 1702 **Власник сорту (код):** 1702

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.03.2018 **Патент №** 180523

Дата пріоритету: 05.06.2013

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,6	34,3	21,6
± до усередненої урожайності, ц/га	-0,7	3,7	-4,8
± до усередненої урожайності, %	-4	12	-18
Стійкість до вилягання, бал	9	7,8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8,6	8,7
Стійкість до осипання, бал	8	7,4	7
Зимостійкість, бал	6	8,6	8
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	7,5	8,6	7,7
Стійкість до ріпакового квіткоїда, бал	7	8,6	6,3
Стійкість до бактеріозу, бал	8,5	8,6	7,7
Стійкість до пероноспорозу, бал	7	8,6	6,2
Вміст білка, %	24,7	22,2	21,1
Вміст олії, %	45,1	48,2	49,4
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,8	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.