

## Ріпак ярий

### **06016006 Хідалго**

**Заявник:** Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широкі, за довжиною - довгі. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Час цвітіння - середній. Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітнього висіву - відсутня або дуже слабка.

Урожайність у зоні Лісостепу – 24,0 ц/га, Полісся - 26,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно - 3,6 і 1,5 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,2-8,3; посухи - 8,3-8,4; осипання - 7,6-7,9 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0; бактеріозом - 8,6-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,2-8,6 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - 0,6%. Вміст жиру в межах 44,0-45,1%, білку - 21,4-22,2%.

### **05016028 Юра**

**Заявник:** Свраліс Семанс

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - вузькі, за довжиною - середні. Зубчастість краю листка слабка. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Час цвітіння - пізній. Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітнього висіву - відсутня або дуже слабка.

Урожайність у зоні Лісостепу – 22,7 ц/га, гарантована прибавка - 2,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,2, посухи - 8,3, осипання - 7,9 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - 0,7%. Вміст жиру - 43,8%, білку - 22,6%.

## Гірчиця сарептська

### **05144002 Ракета**

**Заявник:** Державна наукова установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Рослина за висотою середня, інтенсивність антоціанового забарвлення стебла слабка, форма суцвіття - китиця, форма пластинки нижнього листка ліровидна, опушеність нижнього листка відсутня або дуже слабка, пластинка нижнього листка за розчленуванням - розсічена, восковий наліт на стебловому листку відсутній або дуже слабкий, забарвлення пелюсток квітки золотисто-жовті, стручок за довжиною середній, довжина носика стручка - середня, забарвлення насінини - жовте, вміст олії в насінні високий, ерукова кислота відсутня, час початку цвітіння ранній, тривалість вегетаційного періоду - короткий.

За період випробування урожайність насіння становила 20,0 ц/га, маса 1000 насінин 3,3 г. Висота рослин 130 см. Вегетаційний період 90 діб. Вміст жиру - 44%, ерукової кислоти 0. Сорт середньостійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.