

Сільськогосподарські: кормові**Сорго цукрове****07472001 Довіста**

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення паростка відсутнє. Сходи темно-зелені. Темп початкового росту високий. Рослини високорослі із слабою куцистістю. Товстостебловий, жилка листка біла. Суцвіття овальне, пряме, середнє за щільністю і довжиною, дуже вузьке. Час досягання пізній.

Середня урожайність: сухої речовини - 160 ц/га; насіння – 18,8 ц/га. Вміст сирого протеїну – 8,3%. Вміст клітковини - 28,4%. Сорт середньопізній, має середні показники посухостійкий та високі показники стійкості до хвороб. Напрямок використання - кормовий.

06472001 Пам"яті Шепеля

Заявник: Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" НАУ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення паростка відсутнє. Темп початкового росту середній. Рослини високорослі. Час викидання волоті середній. Листок довгий, середній за шириною, забарвлення центральної жилки зелене. Суцвіття обернено-конусоподібне, пряме, середнє за щільністю і довжиною і шириною. Час досягання ранній.

Середня урожайність: сухої речовини - 145,4 ц/га; насіння – 33,6 ц/га. Вміст сирого протеїну – 8,5%. Вміст клітковини - 28,7%. Сорт середньостиглий, посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Напрямок використання - кормовий.

Суданська трава**06067001 Білявка**

Заявник: Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт має помірне антоціанове забарвлення колеоптиля паростка. Габітус рослини розлогий, середня кількість пагонів і листків. Рослина низька. Стебло середнє за товщиною. Листкова пластинка середнього розміру. Суцвіття довге, нещільне, напіввиступає. Колоски овальні, сильно опушені. Насінина має світло-коричневе забарвлення після досягання, маса 1000 зерен мала. Час викидання волоті дуже ранній.

Середня урожайність: сухої речовини - 61,5 ц/га; насіння – 14,0 ц/га. Вміст сирого протеїну – 9,4%. Вміст клітковини - 23,6%. Сорт середньостиглий, дуже посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Кількість укусів - 2-3. Напрямок використання - кормовий.