

Горошок (Вика яра)

05047002 Євгена

Заявник: Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сіявці рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають помірне антоціанове забарвлення основи стебла, зелене листя.

Час початку цвітіння у сорту середній. На цей час верхнє міжвузля стебла опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини пряма, листочки середньої ширини, антоціанове забарвлення залозок на прилистках відсутнє або дуже слабке, квітка має світло-фіолетове забарвлення паруса.

У фазі повного розвитку боби мають слабке опушення, середню довжину і ширину, середній дзьобик та середню кількість насінних зачатків.

За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння середнє за розміром та округле за формою. Воно має основне сіро-коричнєве забарвлення насінної оболонки та тільки дифузну коричнєву орнаментацию. Вираження коричнєвої орнаментации дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментация відсутня. Насіння має сірувато-коричнєве забарвлення сім'ядолей.

Середня урожайність: сухої речовини - Степ - 46,1 ц/га; Лісостеп - 48,1 ц/га; Полісся - 74,1 ц/га (гарантована прибавка - 8,0 ц/га або 12,0 %); насіння – Степ - 15,7 ц/га; Лісостеп - 13,5 ц/га; Полісся - 23,0 ц/га (гарантована прибавка - 4,7 ц/га або 26,0%). Вміст сирого протеїну – 18,3-19,7 %. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Залистяність - 51,8-62,1 % . Напряв використання - кормовий.

05047001 Ліліана

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сіявці рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають помірне антоціанове забарвлення основи стебла, зелене листя.

Час початку цвітіння у сорту ранній. На цей час верхнє міжвузля стебла не опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини увігнута, листочки широкі, антоціанове забарвлення залозок на прилистках слабке, квітка має світло-фіолетове забарвлення паруса.

У фазі повного розвитку боби мають слабке опушення, середню довжину і ширину, короткий дзьобик та середню кількість насінних зачатків.

За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння середнє за розміром та округле за формою. Воно має основне сіро-коричнєве забарвлення насінної оболонки та тільки дифузну коричнєву орнаментацию. Вираження коричнєвої орнаментации дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментация відсутня. Насіння має оранжеве забарвлення сім'ядолей.

Середня урожайність: сухої речовини - Степ - 45,0 ц/га; Лісостеп - 44,3 ц/га; Полісся - 72,8 ц/га (гарантована прибавка - 6,6 ц/га або 10,0 %); насіння – Степ - 12,8 ц/га; Лісостеп - 10,0 ц/га; Полісся - 21,5 ц/га (гарантована прибавка - 3,3 ц/га або 17,9%). Вміст сирого протеїну – 19,0 - 19,8 %. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Залистяність - 52,8 - 61,0 % . Напряв використання - кормовий.