

Люпин білий**05055001 Макарівський**

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відсутня гірка речовина в зерні. Рослина середня за висотою у фазі початку цвітіння, висока - у фазі зеленої стиглості, пряма, індетермінантний тип росту. Листок зелений. Антоціанове забарвлення стебла відсутнє. Верхівковий листочок короткий і вузький. Квітка синювато-біла. Основне забарвлення зерна в стадії повної стиглості біле, орнаментация відсутня. Час початку цвітіння, зеленої і повної стиглості середній.

Середня урожайність: сухої речовини - Лісостеп - 44,0 ц/га; Полісся - 69,6 ц/га (гарантована прибавка - 4,7 ц/га або 7,3%); насіння - Лісостеп - 27,2 ц/га; Полісся - 29,0 ц/га. Вміст сирого протеїну - 19,0-20,4 %. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Залистяність - 59,3-65,5 %. Вміст алкалоїдів у зеленій масі - 0,010 %, у зерні - 0,017. Напрямок використання - кормовий.

Люпин вузьколистий**05056002 Пелікан**

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Наявна гірка речовина в зерні. Рослина середня за висотою, пряма, індетермінантний тип росту. Листок зелений. Антоціанове забарвлення стебла відсутнє. Верхівковий листочок короткий і вузький. Квітка синювато-біла за кольором. Основне забарвлення зерна в стадії повної стиглості біле, орнаментация відсутня. Час початку цвітіння, зеленої і повної стиглості ранній.

Середня урожайність: сухої речовини - 63,5 ц/га; насіння - 26,0 ц/га. Вміст сирого протеїну - 16,1%. Сорт ранньостиглий, достатньо посухостійкий, має високу стійкість до хвороб. Залистяність - 60,0-63,8 %. Вміст алкалоїдів у зеленій масі - 0,020%, у зерні - 0,025 %. Напрямок використання - кормовий.