

Серадела

06132001 Ольгінська

Заявник: Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

За типом росту рослина пряма, має середню кількість розгалужень.

Стебло середньої довжини, антоціанове забарвлення відсутнє, має слабе опушення.

Листки середньої довжини, еліптичні за формою, прилистки - відсутні.

Суцвіття має від 4 до 5 квіток рожевого кольору.

Біб середнього розміру, вигин відсутній.

Час цвітіння - ранній, досягання - середній.

Середня урожайність: сухої речовини - 51,0 ц/га; насіння - 3,5 ц/га. Вміст сирого протеїну - 15,8%. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, має середні показники стійкості до хвороб. Залистяність - 56,0%. Напрямок використання - кормовий.

Конюшина повзуча (біла)

05053002 Муравка

Заявник: Державний вищий навчальний заклад "Державний агроєкологічний університет"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Листок має середній розмір центрального листочка (3-4 листок від кінця швидкорослого пагона; через 1-2 тижня після цвітіння). Рідко зустрічаються рослини з білими мітками на листках. Черешок листка середнього розміру. Пагони стебла тонкі. Час цвітіння ранній. Рослина зеленого забарвлення.

Середня урожайність сухої речовини - 84,0 ц/га. Вміст сирого протеїну - 25,0%. Сорт ранньостиглий, посухостійкий, має високі показники зимостійкості та стійкості до хвороб. Напрямок використання - кормовий.

04053001 Юра

Заявник: Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ унд Ко.КГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Листок має середню довжину центрального листочка (3-4 листок від кінця швидкорослого пагона; через 1-2 тижня після цвітіння), широкий. Часто зустрічаються рослини з білими мітками на листках. Черешок листка середнього розміру. Час цвітіння ранній. Рослина світло-зеленого забарвлення.

Середня урожайність сухої речовини - 99,0 ц/га. Вміст сирого протеїну - 20,5%. Сорт ранньосередній, посухостійкий, має високі показники зимостійкості та стійкості до хвороб. Напрямок використання - кормовий.