

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; середніми розмірами пластинки, довжини, ширини та відстані від найширшої частини до основи. Ступінь зубчастості вторинних листочків - дуже слабка.

Прилисток добре розвинutий, без наявної форми "кролячих вух" та з восковим нальотом на його поверхні, короткий та широкий з помірною плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з загостrenoю формою верхівки верхнього чашолистка на другому квітучому вузлі.

Колір паруса - білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має велику кількість насінніх зачатків, довгий і вузький, жовтого кольору з наявною пергаментністю, випуклим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насініна неправильної форми, має просту форму крохмальних зерен та середньої зморшкуватості сім'ядолі зеленого кольору. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - середня.

Напрямок використання – для консервації. Дружність дозрівання - 90 %..

Товарна урожайність бобів - 10,4 т/га з вмістом загального цукру - 11 %, вітаміну С - 50 мг/100 г. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів, і при переробці - по 9 балів.

05024004 Женева

Заявник: **Юнемс Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослини сорту дуже низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, з двома квітками на вузлі, має середні час і цвітіння, і достигання.

Стебло - нефасційоване, коротке, має середню кількість вузлів.

Листки - помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: середніми розмірами, наявним восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; середньою довжиною, шириною та відстанню від найширшої частини до основи. Ступінь зубчастості вторинних листочків - дуже слабка.

Прилисток - добре розвинутий, без наявної форми "кролячих вух" та восковим нальотом на його поверхні, має середні довжину та ширину з помірною плямистістю.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка із загостrenoю формою верхівки верхнього чашолистка на другому квітучому вузлі.

Колір паруса - білий, з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має велику кількість насінніх зачатків, довгий і вузький, жовтого кольору, з наявною пергаментністю, з увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насініна неправильної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору та відсутнім чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - мала.

Сорт характеризується універсальним напрямком використання (сушіння, консервування, споживання в свіжому вигляді). Дружність дозрівання - 90 %..

Товарна урожайність бобів - 8,8 т/га з вмістом загального цукру - 11 %, вітаміну С - 50 мг/100 г. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів, і при переробці - по 9 балів.

05024003 Каріна

Заявник: **Юнемс Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками та кількістю квіток на вузлі від одної до двох, має ранні як час цвітіння, так і час досягнення.

Стебло - нефасційоване, коротке, має середню кількість вузлів.

Листки - помірно зеленого кольору, без сіруватого відтінку.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; середніми розмірами довжини, ширини та відстані від найширошої частини до основи. Ступінь зубчастості вторинних листочків - дуже слабка.

Прилисток добре розвинутий, без наявної формою "кролячих вух" та з восковим нальотом на його поверхні, середньої довжини та широкий з помірною плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з загостrenoю формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса - білий, з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та помірною інтенсивністю хвильастості.

Біб має середню кількість насінніх зачатків, середню довжину, вузький, жовтого кольору, з наявною пергаментністю, з випуклим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насініна циліндричної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору та відсутнє чорне забарвлення рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Сорт характеризується універсальним напрямком використання (сушіння, консервування, споживання в свіжому вигляді). Дружність дозрівання - 90 %.

Товарна урожайність бобів - 10,4 т/га з вмістом загального цукру - 11 %, вітаміну С - 50 мг/100 г. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів, і при переробці - по 9 балів

04024007 Ода

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ярд"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками та з двома квітками на вузлі, має ранній час і цвітіння, і досягнення.

Стебло - нефасційоване, середньої довжини, має велику кількість вузлів.

Листки помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: наявним восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; середніми розмірами пластинки, довжини, ширини та відстані від найширошої частини до основи, без зубчастості.

Прилисток добре розвинутий, без наявної формою "кролячих вух" та з восковим нальотом на його поверхні, має середні параметри довжини та ширини з дуже щільною плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з округлою формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса - білий, з середнім показником максимальної його ширини, прямою формою основи та помірною інтенсивністю хвильастості.

Біб має велику кількість насінніх зачатків, середні показники довжини та ширини, зеленого кольору, з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насініна неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сильну зморшкуватість сім'ядолей зеленого кольору. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - велика.