

розлусний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Висота рослини від 176 до 250 см, час повного цвітіння волоті та час появи "шовку" - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє, качан конічної форми, короткий, діаметр качана середній (3,1 - 4,0 см) колір зернівки – жовтий.

ФАО – 210.

Загальна урожайність, т/га – 3,96

Вегетаційний період – 111 діб.

Маса 1000 зерен – 148 г.

Маса кондиційного качана – 110 г,

Довжина качана – 17 см,

Кількість рядів зерен на качані – 18 шт.,

Стійкість проти вилягання - 8 балів.

Вміст у зерні сухої речовини - 40,1 %, крохмалю – 56,0%.

Кукурудза цукрова

05032006 Арктур

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній від 26 до 50. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - середнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - середнє. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - коротка. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - дуже короткий (менше 8 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки зернини - оранжевий, низу зернини - жовтувато - білий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Загальна урожайність - 11 т/га. Вегетаційний період - 71 доба. Маса кондиційного качана - 200 г.

Вихід кондиційних качанів 80 %, вихід технічно стиглого зерна від маси качана - 64,2 %. Вміст у зерні сухої речовини - 30,6%, цукру -19,3%.

02032003 Андрія F1

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка тупа. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабе, кут між листовою пластинкою і стеблом - від малого до середнього. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - від середньої до широкої. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній.