

розлусний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Висота рослини від 176 до 250 см, час повного цвітіння волоті та час появи "шовку" - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє, качан конічної форми, короткий, діаметр качана середній (3,1 - 4,0 см) колір зернівки – жовтий.

ФАО – 210.

Загальна урожайність, т/га – 3,96

Вегетаційний період – 111 діб.

Маса 1000 зерен – 148 г.

Маса кондиційного качана – 110 г,

Довжина качана – 17 см,

Кількість рядів зерен на качані – 18 шт.,

Стійкість проти вилягання - 8 балів.

Вміст у зерні сухої речовини - 40,1 %, крохмалю – 56,0%.

Кукурудза цукрова

05032006 Арктур

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(i):

Підтримувач(i):

Форма верхівки першого листка - від загостrenoї до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній від 26 до 50. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - середнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - середнє. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - коротка . Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - дуже короткий (менше 8 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки зернини - оранжевий, низу зернини - жовтувато - білий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Загальна урожайність - 11 т/га. Вегетаційний період - 71 доба. Маса кондиційного качана - 200 г.

Вихід кондиційних качанів 80 %, вихід технічно стиглого зерна від маси качана - 64,2 %. Вміст у зерні сухої речовини - 30,6%, цукру - 19,3%.

02032003 Андрія F1

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(i):

Підтримувач(i):

Форма верхівки першого листка тупа. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - від малого до середнього. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана) - від середньої до широкої. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формую циліндричний, за довжиною - середній.

Товарний урожай - 140 ц/га, маса 1000 насінин - 190 г. Вегетаційний період - 94 діб. Вихід чистого зерна - 65,4%. Вміст сухої речовини - 25 %, цукру - 10,5 %.

06032004 Бандіт F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - загострено-тупа. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє, кут між листковою пластинкою і стеблом - великий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана) - широка. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - довгий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 230 ц/га. Вегетаційний період - 80 діб. Вихід чистого зерна - 34 %, Вміст сухої речовини - 28 %.

05032007 Гламур

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - середнє, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній (від 26 до 50 град.). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" середнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формую конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (9 - 10 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Загальна урожайність - 17 т/га. Вегетаційний період - 85 діб. Висота рослини - 160 см, маса кондиційного качана - 250 г. Кількість рядів зерен на качані - 14. Вихід кондиційних качанів 87,5 %, вихід технічно стиглого зерна від маси качанів - 69,8 %. Вміст в зерні сухої речовини - 32,2, цукру - 14%.

06032005 Ескалібур F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - середня. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана) - широка. Ніжка качана за