

Товарний урожай - 140 ц/га, маса 1000 насінин - 190 г. Вегетаційний період - 94 днів. Вихід чистого зерна - 65,4%. Вміст сухої речовини - 25 %, цукру - 10,5 %.

06032004 Бандіт F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - загострено-тупа. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє, кут між листовою пластинкою і стеблом - великий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - широка. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 230 ц/га. Вегетаційний період - 80 днів. Вихід чистого зерна - 34 %, Вміст сухої речовини - 28 %.

05032007 Гламур

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - середнє, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній (від 26 до 50 град.). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" середнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (9 - 10 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Загальна урожайність - 17 т/га. Вегетаційний період - 85 днів. Висота рослини - 160 см, маса кондиційного качана - 250 г. Кількість рядів зерен на качані - 14. Вихід кондиційних качанів 87,5 %, вихід технічно стиглого зерна від маси качанів - 69,8 %. Вміст в зерні сухої речовини - 32,2, цукру - 14%.

06032005 Ескалібур F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - широка. Ніжка качана за

довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів велика, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 230 ц/га. Маса 1000 насінин - 185 г. Вегетаційний період - 85 діб. Вихід чистого зерна - 39 %. Вміст сухої речовини - 28,5 %.

06032006 Люміна F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно - циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів - велика, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 240 ц/га, урожай ранньої продукції - 240 ц/га. Маса 1000 насінин 225 г. Вегетаційний період - 83 доби. Вміст сухої речовини в зерні - 27 %.

06032003 Мегатон F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листовою пластинкою і стеблом - великий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною коротка. Качан за формою конусно - циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів - велика, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 270 ц/га. Маса 1000 насінин - 170 г. Вихід чистих качанів - 170 %. Вихід чистого зерна - 33 %.

Діб до досягання - 86. Вміст сухої речовини - 28 %.

07004019 Насолода

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок слабке. Волоть нещільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині