

волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - середня, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє. ФАО - 210 (середньоранні). Вегетаційний період - 118 діб. Загальна врожайність, 18 т/га, товарна врожайність - 15 т/ га. Маса 1000 зерен - 187 г. Кількість рядів зерен на качані - 18. Вміст в зерні: сухої речовини - 18,2 %, цукру - 7,5 %, крохмалю - 19,5 %, клітковини - 2,5 %.

04032004 Перфекта F1

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Положення бічних гілочок на волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - невелика (від 6 до 15шт.), головна вісь волоті за довжиною - середня (від 31 до 40 см). Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (9 - 10 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Вегетаційний період - 118 діб. Урожай ранньої продукції - 130 ц/га, товарна врожайність - 180-200 ц/ га. Вихід чистих качанів - 97 %, вихід чистого зерна 98 %. Загальний цукор - 12 %.

06032007 Світ Райзер F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(і):

Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже ранній, інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - коротка. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно - циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів - середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 190 ц/га. Маса 1000 насінин - 230 г. Вихід чистого зерна - 31 %. Діб до достигання - 68. Вміст сухої речовини - 27%.

06032002 Санданс F1

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - середнє, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній від (26 до 50 град.). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі