

волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - середнє. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" середня. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (9 - 10 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 190 ц/га, урожай ранньої продукції - 161 ц/га. Маса 1000 насінин - 220 г.

Вихід чистого зерна - 45%.

Вміст сухої речовини 27 %, цукру - 13%, крохмалю - 19%.

### **06032001 Тронка F1**

**Заявник:** Приватне підприємство "Агросвіт"

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - середнє, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній (від 26 до 50 градусів). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня, до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (9 - 10 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 133 ц/га, урожай ранньої продукції - 125 ц/га. Маса 1000 насінин - 240 г. Вихід чистих качанів 91,7 %. Діб до достигання - 115. Вихід чистого зерна - 62,3 %.

Вміст сухої речовини - 27,2 %, цукру - 7,34, клітковини 2,12 %, крохмалю 7,68 %

## **Морква**

### **06034007 Болтекс**

**Заявник:** Клоз Тезьє

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Розетка листків вузька. Листок напівпрямий за положенням у просторі, середньої довжини, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід короткий, діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескاته. Форма кінчика коренеплоду тупа. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Борізки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Час достигання рослини середній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 90,0 т/га, середня маса плоду 50 г, лежкість 90%, днів до достигання 100. Вміст: Загальний цукор, % - 6,5. Суха речовина, % - 10,0.

### **07034001 Бастія F1**

**Заявник:** Бейо Заден Б.В.

**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Вузька розетка листків. Листок напівпрямий за положенням у просторі, короткий, розсіченість тонка. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід середній за довжиною, діаметр малий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плескатоокругла. Місце прикріплення листків піднесене. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра дуже малий. Забарвлення серцевини червоне сильною інтенсивності. Час досягання рослини ранній. Тенденція до стрілкування слабка. Тип чоловічої стерильності - коричневі пиляки.

Альтернаріоз, % - 7, гниль суха, % - 9. Днів до досягання - 110. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 8,1. Товарний урожай, кг/м<sup>2</sup> - 6,0.

**07034002 Балтімор F1****Заявник:** Бейо Заден Б.В.**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Широка розетка листків. Листок прямий за положенням у просторі, довгий, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий, діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні відсутні або дуже слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Час досягання рослини ранній. Тенденція до стрілкування слабка. Тип чоловічої стерильності - коричневі пиляки.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Днів до досягання - 130. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 8,0. Товарний урожай, кг/м<sup>2</sup> - 6,0.

**05034008 Вереснева****Заявник:** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Розетка листків вузька. Листок напівпрямий за положенням у просторі, довгий, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід дуже довгий, діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Борізки на поверхні помірно виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній. Забарвлення серцевини оранжеве сильною інтенсивності. Час досягання рослини середній. Тенденція до стрілкування середня.

Товарна урожайність 45,0 т/га, середня маса плоду 150-200 г, лежкість 92%, днів до досягання 100. Вміст: Загальний цукор, % - 6,7. Суха речовина, % - 9,7.

**06034002 Гіганта****Заявник:** Нікерсон- Цваан Б.В.**Власник(и):**