

кінчика коренеплоду тупа. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Борізки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Час досягання рослини пізній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 91,0 т/га, середня маса плоду 250г, лежкість 98%, днів до досягання 137. Дегустаційна оцінка 8,7 балів. Вміст: Сухої речовини 13,7%, загального цукру 8,3%.

### **06034005 Канада F1**

**Заявник:** Бейо Заден Б.В.

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Розетка листків вузька. Листок напівпрямий за положенням у просторі, короткий, розсіченість тонка. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий, діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутно-вузьковидовжена, форма плеча піднесена. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Борізки на поверхні виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Час досягання рослини середній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 100,0 т/га, середня маса плоду 120 г, лежкість 90%, днів до досягання 130. Вміст: Загальний цукор, % - 6,9. Суха речовина, % - 8,5.

### **07034003 Купар F1**

**Заявник:** Бейо Заден Б.В.

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Середня розетка листків. Листок прямий за положенням у просторі, середній, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід середній за довжиною, діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні відсутні або дуже слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Тенденція до стрілкування слабка. Тип чоловічої стерильності - пелюсткові пиляки.

Альтернатив, % - 3. Гниль суха, % - 2. Днів до досягання - 134. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 8,2. Товарний урожай, кг/м<sup>2</sup> - 7,0.

### **07034004 Каскад F1**

**Заявник:** Бейо Заден Б.В.

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Середня розетка листків. Листок горизонтальний за положенням у просторі, середній за розміром, розсіченість груба. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід середній за довжиною, діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини червоне сильної інтенсивності. Тенденція до стрілкування слабка. Тип чоловічої стерильності - коричневі пиляки.