

## Перець солодкий

### **05037025 Велетень**

**Заявник:** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотила паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глясуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть товста. Час досягання ранній.

Товарний урожай 35,0 т/га, середня маса плоду 250 г; дегустаційна оцінка 8,7 балів; вихід стиглих товарних плодів 85,0 %; днів до досягання - 125; дружність досягання 8,0 балів; суха речовина 7,4%; загальний цукор 3,3%; вітамін С 225 мг/%; клітковина 1,8%.

### **05037024 Лада**

**Заявник:** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотила паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок світло-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глясуватість. Переважна кількість часток у плоді дві-три. М'якоть середньої товщини. Час досягання ранній.

Товарний урожай 25,0 т/га, середня маса плоду 95 г; дегустаційна оцінка 9,0 балів; вихід стиглих товарних плодів 95,0 %; днів до досягання - 108; дружність досягання 8,2 балів; суха речовина 6,7%; загальний цукор 3,3%; вітамін С 250 мг/%; клітковина 1,6%.

### **06037013 Паланська Бабура**

**Заявник:** Центр овочівництва

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотила паростка. Рослина розлога за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок середній за розміром, темно-зеленого кольору, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду горизонтальне. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глясуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час цвітіння і досягання ранній.

Середня маса плоду 120 г; вміст сухої речовини 7,6%; дегустаційна оцінка 9 балів; вихід стиглих товарних плодів 90 %; транспортабельність 8%; днів до досягання - 110; дружність досягання 7 балів; суха речовина - 8,6%; загальний цукор - 3,5%; вітамін С - 166 мг/%; клітковина - 1,2%.

### **05037001 Сандра**

**Заявник:** Приватне мале підприємство "Тирас"